



Azitromicina



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve la azitromicina?

La azitromicina es un antibiótico.

Es un medicamento que se utiliza para las infecciones provocadas por algunos tipos de bacterias.

Azitromicina sirve para tratar infecciones:

- Respiratorias.
- De garganta y oído.
- De la piel.
- Por clamidia, que es una bacteria que afecta a los órganos urinarios de hombres y mujeres y a los órganos sexuales de las mujeres.

Este medicamento es para niños y adultos.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes azitromicina.
- Nunca tomes antibióticos para infecciones provocadas por un virus, por ejemplo, una gripe o un catarro.
- Avisa a tu médico si tienes diarrea con sangre o con moco mientras tomas azitromicina y después de terminar el tratamiento.



¿Cuándo puedo tomar azitromicina?

Nunca debes tomar azitromicina en estos casos

- Cuando tienes alergia a la azitromicina.
- Cuando tienes alergia a otros antibióticos.
- Cuando has tenido una reacción alérgica cuando has tomado algún antibiótico, por ejemplo, hinchazón en la cara o la garganta y problemas para respirar.

Consulta a tu médico

cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar azitromicina

- Problemas de hígado o de riñón.
- Una enfermedad de corazón llamada intervalo QT prolongado.
- Pulso lento o latido del corazón lento.
- Nivel bajo de minerales en sangre, como potasio y magnesio.
- Enfermedades del sistema nervioso o del cerebro.
- Problemas mentales, de comportamiento o emocionales.
- Miastenia grave, que es una enfermedad que produce cansancio y debilidad en los músculos.



Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar azitromicina

- Contra la migraña.
- Para ajustar el ritmo del latido del corazón.
- Para problemas de estómago.
- Contra alergias.
- Contra la acidez de estómago.
- Contra la coagulación de la sangre,
- es decir, medicamentos que mantienen la sangre líquida.
- Para enfermedades del corazón.
- Contra la gota,
- que es una enfermedad que produce dolor en las articulaciones.
- Contra el sida.
- Contra rechazo de trasplantes.
- Contra el dolor.
- Contra infecciones por hongos.



¿Cuánta azitromicina puedo tomar?

- Niños que pesen más de 45 kilos y mayores de 18 años:
Lo habitual es tomar azitromicina 1 vez al día.
 - Cuando el tratamiento dura 3 días:
Hay que tomar 1 dosis al día de 500 miligramos.
 - Cuando el tratamiento dura 5 días:
Hay que tomar 1 dosis de 500 miligramos el primer día
y 1 dosis de 250 miligramos los otros cuatro días.
- Niños que pesen menos de 45 kilos:
La cantidad diaria depende del peso del niño.
No usar en niños menores de 1 año.



- Personas con infección por clamidia:
Lo habitual es tomar una sola dosis de 1.000 miligramos en un solo día.
- Personas con enfermedades de hígado o riñón:
Es posible que el médico le indique
que tome una cantidad menor de lo habitual.



¿Cómo debo tomar azitromicina?

Azitromicina puede tomarse de las siguientes formas:

- Comprimidos o cápsulas: deben tragarse con un poco de agua.
- Sobres: deben disolverse en medio vaso de agua.

Cada comprimido, cápsula o sobre puede tener un contenido diferente:
200 miligramos, 250 miligramos, 500 miligramos y 1 gramo.
1 gramo son 1.000 miligramos.

Puedes tomar azitromicina fuera de las comidas.

Cuando necesitas tomar un medicamento para la indigestión,
como un antiácido, tienes que tomar azitromicina
al menos 1 hora antes o 2 horas después de comer.

Pregunta a tu médico o farmacéutico la mejor solución
si tienes problemas para tragar.



Deja de tomar azitromicina de forma inmediata

Deja de tomar azitromicina y avisa enseguida a tu médico
en los siguientes casos:

- Ronchas o sarpullidos grandes en la piel.
- Hinchazón en labios, cara o cuello que produce problemas para respirar.
- Ampollas o sangrado de ojos, nariz, labios, boca y órganos sexuales.



Salud más fácil

- Ritmo extraño del latido del corazón.
- Diarrea con sangre o moco durante mucho tiempo.

Azitromicina puede tener otros efectos adversos muy raros.
Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas azitromicina,
avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar azitromicina?

- Cuando me toca la siguiente toma en un rato:
Sáltate la toma.
Haz la siguiente toma a la hora de siempre.
**Nunca tomes el doble de cantidad
para compensar la toma olvidada.**
- Cuando todavía me queda mucho tiempo para la siguiente toma:
Toma azitromicina enseguida.



¿Qué hago si he tomado más azitromicina del debido?

Cuando tienes una sobredosis,
quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas azitromicina y cuánta has tomado.

Avisa enseguida de la sobredosis, aunque no sientas nada.

Los síntomas que puedes tener con una sobredosis son náuseas, vómitos,
diarrea y pérdida de oído durante un tiempo.

.



Efectos adversos de azitromicina

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento, porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Azitromicina puede tener los siguientes efectos adversos muy habituales:

- Diarrea
- Habituales
- Dolor de cabeza
- Náuseas.
- Vómitos.
- Dolor de estómago
- Alteración de algunos componentes de la sangre,

pero solo puede verse en un análisis.

Azitromicina puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas azitromicina, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

