



Claritromicina



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve la claritromicina?

La claritromicina es un antibiótico.

Es un medicamento que se utiliza para las infecciones provocadas por algunos tipos de bacterias.

Claritromicina sirve para tratar algunas infecciones:

- De nariz y garganta.
- Respiratorias.
- De la piel.
- Úlceras de estómagos provocadas por una bacteria.

Este medicamento es para mayores de 12 años.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes claritromicina.



Salud más fácil

- Nunca tomes antibióticos para infecciones provocadas por un virus, por ejemplo, una gripe o un catarro.
- Avisa a tu medico si tienes diarrea fuerte y durante mucho tiempo mientras tomas claritromicina.



¿Puedo tomar claritromicina?

Nunca debes tomar claritromicina en estos casos

- Cuando tienes alergia a la claritromicina.
- Cuando has tenido tú o alguien de tu familia problemas en el ritmo del latido del corazón porque puedes haberlo heredado y no saberlo.
- Cuando tienes problemas graves de riñón o hígado.
- Cuando tienes un nivel bajo de potasio o magnesio en la sangre. El potasio y el magnesio son 2 minerales importantes para el buen funcionamiento del cuerpo.
- Cuando tomas algunos medicamentos, por ejemplo:
 - Contra la coagulación de la sangre, es decir, medicamentos que mantienen la sangre líquida.
 - Contra la angina de pecho.
 - Contra los dolores muy fuertes de cabeza.
 - Contra los ardores o acidez de estómago.
 - Contra las alucinaciones.
 - Para las alergias.
 - Contra el colesterol.
 - Otros medicamentos que pueden afectar al ritmo del latido del corazón.



Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar claritromicina

- Eres mujer y estás embarazada, quieres quedarte embarazada o crees que puedes estar embarazada.
- Tienes problemas graves de hígado o riñón.
- Tienes diabetes, es decir, azúcar en la sangre.
- Tienes problemas de corazón.
- Tienes poco magnesio en la sangre.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar claritromicina

- Contra alergias.
- Para las alucinaciones.
- Contra la acidez y los ardores de estómago.
- Contra la migraña, que es un dolor muy fuerte de cabeza.
- Contra el colesterol.
- Contra la coagulación de la sangre, es decir, medicamentos que mantienen la sangre líquida.
- Para la angina de pecho.
- Para dormir.
- Para enfermedades del corazón.
- Contra el asma.
- Medicamentos que bajan las defensas del cuerpo.
- Para mejorar la circulación de la sangre en las piernas.
- Contra la diabetes, es decir azúcar en la sangre.
- Medicamentos con cortisona, contra los dolores por inflamación.
- Para la epilepsia.
- Para mejorar las erecciones en los hombres.
- Contra el cáncer.
- Otros antibióticos, sobre todo, para infecciones de oídos y para las infecciones provocadas por hongos.



Salud más fácil

- Para problemas de la vesícula biliar, que está junto al hígado y ayuda en la digestión.
- Contra el sida.
- Hierbas naturales, como la hierba de San Juan.



¿Cuánta claritromicina puedo tomar?

- Para los mayores de 12 años:
Lo habitual es tomar 1 comprimido de 250 miligramos 2 veces al día.
Tu médico puede indicarte que aumentes la cantidad a 2 comprimidos de 250 miligramos 2 veces al día o 1 comprimido de 500 miligramos 2 veces al día.
- Para los mayores de 12 años con úlcera de estómago provocada por una bacteria:
Lo habitual es tomar 2 comprimidos de 250 miligramos 2 veces al día o 1 comprimido de 500 miligramos 2 veces al día.
Tu médico te indicará que tomes claritromicina con otros antibióticos o con otras medicinas para el estómago.
- Personas con problemas de riñón:
Es posible que el médico te indique que tomes una cantidad menor de lo habitual.



¿Cómo debo tomar claritromicina?

Claritromicina puede tomarse como comprimidos.
Hay que tragarlos enteros con un vaso de agua.
Este medicamento puede tomarse de otras formas.

Los comprimidos tienen diferentes concentraciones.



Salud más fácil

Pueden ser de 250 miligramos o 500 miligramos.

Puedes tomar claritromicina con o sin comida.

Toma claritromicina el tiempo que el médico te diga, aunque te encuentres mejor.

Cuando dejas claritromicina antes de tiempo, la infección puede volver.

¿Cuánto tiempo debo tomar claritromicina?

Tú médico te dirá durante cuánto tiempo debes tomar claritromicina.

Lo normal es tomar claritromicina durante un tiempo entre 6 y 14 días.

Es importante que sigas tomando claritromicina al menos 2 días después de que no tengas síntomas de la infección.

En algunos tipos de infecciones, tienes que tomar claritromicina durante 10 días, por lo menos.

No dejes de tomar claritromicina antes de que te lo diga tu médico aunque pienses que ya se te ha pasado la infección.



Deja de tomar claritromicina de forma inmediata

Deja de tomar claritromicina y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Problemas para respirar, hablar o tragar.
- Hinchazón en labios, cara o cuello.
- Sensación de fuerte mareo o desmayo.
- Piel irritada y ampollas con dolor en ojos, boca y órganos sexuales.
- Fuerte diarrea, incluso con sangre mientras tomas claritromicina o cuando terminas de tomarla.
- Pocas ganas de comer, color amarillo en la piel, orina oscura, heces de color muy claro y dolor en el vientre.



Salud más fácil

- Latido del corazón rápido o con un ritmo raro.
- Dolor fuerte en el vientre y la espalda provocado por un problema grave en el páncreas.
- Piel irritada o manchas rojas con ampollas y bultos debajo de la piel.

Claritromicina puede tener otros efectos adversos muy raros.

Si sientes algún algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas claritromicina, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar claritromicina?

- Si te toca la siguiente toma en un rato:
Sáltate la toma.
Haz la siguiente toma a la hora de siempre.
Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.
- Si todavía te queda mucho tiempo para la siguiente toma:
Toma claritromicina enseguida.



¿Qué hago si he tomado más claritromicina de la debida?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas claritromicina y cuánta has tomado.

Avisa enseguida de la sobredosis, aunque no sientas nada raro o especial.



Los síntomas que puedes tener con una sobredosis son molestias en el estómago o el intestino.



Efectos adversos de claritromicina

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Claritromicina puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Problemas para dormir.
- Dolor de cabeza.
- Cambios en el gusto y el olfato, por ejemplo, sientes que la comida sabe a metal o te amarga.
- Ganas de vomitar.
- Vómitos.
- Dolor en el vientre.
- Mareos.
- Mala digestión.
- Piel irritada o manchas rojas.
- Mucho sudor.
- Mal funcionamiento del hígado que solo puede verse en un análisis.

Claritromicina puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algún algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas claritromicina, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento,
avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de



Salud más fácil

