



Ondansetron



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el ondansetron?

El ondansetron es un medicamento que sirve para quitar o aliviar los vómitos y la sensación de náusea causada por:

- El uso de medicamentos de quimioterapia contra el cáncer en adultos y niños mayores de 6 meses de edad.
- El tratamiento de radioterapia contra el cáncer en adultos.

Ondansetron también sirve para evitar las náuseas y los vómitos después de una operación en adultos.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes ondansetron.
- Avisa a tu médico cuando tomas ondansetron y sientes pocos efectos o efectos muy fuertes.
- Avisa a tu médico cuando tomas ondansetron y te van a operar o si te van a realizar alguna prueba como análisis de sangre o de orina.



- Avisa a tu médico si estás embarazada, crees que podrías estar embarazada o estás dando el pecho.
- Si eres mujer en edad fértil debes usar un método anticonceptivo seguro durante el tratamiento con ondansetron.
- No dejes de tomar ondansetron mientras no te lo diga tu médico.



¿Puedo tomar ondansetron?

Nunca tomes ondansetron

- Cuando tienes alergia al ondansetron.
- Si tienes o has tenido alergia a otros medicamentos similares para las náuseas o vómitos.
- Cuando tomas medicamentos para tratar el Parkinson.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar ondansetron

- Cuando tienes un problema de hígado.
- Cuando tienes bloqueo en el intestino o sufres estreñimiento grave.
- Cuando tienes problemas de corazón, como un latido irregular.
- Cuando te acaban de operar de las anginas.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar ondansetron

- Para tratar infecciones en los pulmones, como la tuberculosis.
- Para el dolor.
- Para tratar la epilepsia.
- Para tratar el corazón y la tensión alta.
- Para tratar el cáncer.
- Para la depresión y la ansiedad.



¿Cuánto ondansetron puedo tomar?

- **Adultos con náuseas y vómitos causados por quimioterapia y radioterapia.**
8 miligramos 1 o 2 horas antes del tratamiento médico que te provoca las náuseas y vómitos.
Toma otros 8 miligramos de ondansetron 12 horas después del tratamiento.
Para prevenir las náuseas y los vómitos los días siguientes al tratamiento, el médico te puede decir que tomes ondansetron varios días después.
- **Niños mayores de 6 años y adolescentes con náuseas y vómitos causados por quimioterapia.**
El médico decidirá la dosis en función del peso.
Lo normal es tomar 4 miligramos 2 veces al día.
- **Para prevenir náuseas y vómitos en adultos después de una operación.**
El médico te puede decir que tomes 16 miligramos de ondansetron 1 hora antes de la anestesia.
- **Adultos con problemas de hígado.**
La dosis debe ajustarse y tomarás como mucho 8 miligramos al día.
- **Adultos con problemas de riñones y personas muy mayores.**
No es necesario ajustar la dosis diaria.



¿Cómo debo tomar ondansetron?

Ondansetron puede tomarse como comprimidos.
Hay que tragarlos con un poco de agua sin masticar.
Los comprimidos pueden ser de 4 miligramos y 8 miligramos.



Deja de tomar ondansetron de forma inmediata

Ondansetron puede tener otros efectos muy raros.
Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo
mientras tomas Ondansetron,
avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar ondansetron?

Puedes encontrarte en estas 2 situaciones:

- Si no tienes síntomas de vómitos,
toma la siguiente dosis con normalidad.
- Si tienes síntomas de vómitos,
toma otra dosis tan pronto como sea posible
y luego continúa tomando el medicamento como te han indicado

Recuerda avisar a tu médico del día que te olvidaste de tomar ondansetron.



¿Qué hago si he tomado más ondansetron del debido?

Cuando tienes una sobredosis,
quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas ondansetron y cuánto has tomado.

Los síntomas de una sobredosis de ondansetron son problemas para ver,
tensión baja, mareos, desmayos o latido extraño del corazón.



Efectos adversos de ondansetron

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal. Ondansetron puede tener los siguientes efectos adversos:

- Muy habituales
 - Dolor de cabeza.
- Habituales
 - Sensación de calor.
 - Estreñimiento.

Ondansetron puede tener también otros efectos adversos poco habituales, raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas ondansetron, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

SANDOZ

Con el aval de

