



Letrozol



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el letrozol?

Letrozol es un medicamento que reduce la cantidad de estrógeno.

Los estrógenos son las hormonas sexuales femeninas.

Impide el crecimiento de cánceres de mama

que necesitan estrógenos para crecer.

Con este medicamento, las células del tumor crecen de forma más lenta o impide que crezca hacia otras partes del cuerpo.

Letrozol se utiliza para tratar el cáncer en mujeres que han pasado la menopausia, es decir que ya no tienen la regla.

Puedes utilizar Letrozol:

- Para prevenir que el cáncer de mama aparezca de nuevo.
- Como primer tratamiento antes de una cirugía de cáncer de mama, en casos en que el médico debe esperar para operarte.
- Como primer tratamiento después de la cirugía de cáncer de mama.



Salud más fácil

- Como tratamiento alternativo después de 5 años de tratamiento con un medicamento que se llama tamoxifeno.
- Para prevenir que el tumor de mama se extienda a otras partes del cuerpo en pacientes con un cáncer de mama avanzado.

Los niños y adolescentes no deben usar este medicamento.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes letrozol.
- Este medicamento puede dar un resultado positivo en las pruebas de dopaje en los deportistas.
El dopaje es el uso de sustancias o medicamentos prohibidos para aumentar el rendimiento en el deporte.
- Tu médico puede realizar pruebas para controlar la osteoporosis, antes, durante y después del tratamiento.
La osteoporosis hace que los huesos se debiliten y se vuelvan frágiles.



¿Puedo tomar letrozol?

Nunca tomes letrozol

- Cuando tienes alergia al letrozol.
- Cuando todavía estás con la regla.
- Si estás embarazada o dando el pecho.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar letrozol

- Problemas de riñón.



Salud más fácil

- Problemas de hígado.
- Osteoporosis o roturas de huesos.

Avisa enseguida a tu médico

si tienes inflamación, dolor o lesiones en los tendones.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas letrozol, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar letrozol

Avisa a tu médico o farmacéutico de los medicamentos que estás tomando, has tomado o si debes tomar cualquier otro medicamento.

Avisa también de los medicamentos que tomas sin receta médica.



¿Cuánto letrozol puedo tomar?

Lo habitual es tomar 1 comprimido de 2,5 miligramos una vez al día.



¿Cómo debo tomar letrozol?

Letrozol se toma en comprimidos con un vaso de agua.

Letrozol lo puedes tomar con o sin comida.

Si tomas letrozol a la misma hora cada día, te ayudará a recordar cuándo debes tomar el comprimido.

Los comprimidos son de 2,5 miligramos.

¿Cómo debo dejar de tomar letrozol?

Nunca dejes de tomar letrozol de pronto.

Tu médico te dirá cómo dejar de tomar letrozol y cuándo debes terminar.

Si dejas de tomar letrozol



Salud más fácil

antes de que tu médico te lo diga,
puede que no te funcione el tratamiento.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar letrozol?

Si es casi la hora del siguiente comprimido,

sáltate la toma que te has olvidado

y haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Si ha pasado poco tiempo de la hora que correspondía,

toma tu comprimido tan pronto como lo recuerdes

y después sigue tomando el siguiente comprimido

como lo harías normalmente.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más letrozol del debido?

Cuando tienes una sobredosis,

quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas estradiol y cuánto has tomado.

Avisa enseguida de la sobredosis, aunque no sientas nada.



Efectos adversos del letrozol

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Letrozol puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Disminución del grosor del hueso.



- Pérdida de hueso.
- Sofocos y aumento del sudor.
- Caída de cabello.
- Sangrados por la vagina.
- Cansancio.
- Aumento del colesterol.

Letrozol puede tener también otros efectos adversos poco habituales, raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas letrozol, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

