



Anastrozol



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el anastrozol?

El anastrozol es un medicamento que sirve para tratar el cáncer de mama en mujeres que tienen la menopausia.

La menopausia es la desaparición definitiva de la menstruación en las mujeres.

Suele ocurrir entre los 40 y 50 años.

El anastrozol impide que el cuerpo cree una sustancia que se llama aromatasa.

De esta forma, reduce la cantidad de hormonas que se llaman estrógenos.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes anastrozol.



- Avisa al personal de salud cuando estás tomando anastrozol y vas a ingresar en el hospital.
- No tomes anastrozol si estás embarazada, crees que puedes estar embarazada o estás dando el pecho.
- Avisa a tu médico cuando eres deportista y tomas anastrozol. Puedes dar resultado positivo en pruebas de control de dopaje.



¿Puedo tomar anastrozol?

Nunca tomes anastrozol

- Cuando tienes alergia al anastrozol o algún componente de este medicamento.
- Cuando estás embarazada crees que puedes estar embarazada o estás dando el pecho.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar anastrozol

- Cuando todavía tienes la menstruación y no has pasado la menopausia.
- Tienes problemas en los huesos como osteoporosis.
- Tienes problemas de hígado.
- Tienes problemas de riñones.



Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar anastrozol

- Para tratar el cáncer de mama.
Por ejemplo, medicamentos que tienen tamoxifeno.
- Medicamentos que tienen estrógenos
para tratar problemas hormonales.
Por ejemplo, medicamentos de terapia hormonal de sustitución.
- Para tratar problemas de salud de ginecología.
- Para tratar la infertilidad.



¿Cuánto anastrozol puedo tomar?

Tu médico te indicará cuánto anastrozol debes tomar y cuánto tiempo durará el tratamiento.

Lo habitual es tomar 1 dosis
1 vez al día.

La duración del tratamiento suele ser largo
y puedes tomarlo durante varios años.



¿Cómo debo tomar anastrozol?

Anastrozol puede tomarse como comprimidos.

Hay que tragarlos enteros con un poco de agua,
sin masticar ni triturar.

Es recomendable tomar anastrozol siempre a la misma hora.
Puedes tomarlo con o sin comidas.



¿Cómo debo dejar de tomar anastrozol?

El médico te indicará la forma de disminuir la dosis hasta acabar el tratamiento.



Deja de tomar anastrozol de forma inmediata

Deja de tomar anastrozol y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Reacción en la piel grave con úlceras o ampollas.
- Reacción alérgica con hinchazón de la garganta con dificultad para tragar o respirar.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar anastrozol?

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más anastrozol del debido?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas anastrozol y cuánto has tomado.



Efectos adversos de anastrozol

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Anastrozol puede tener los siguientes efectos adversos muy habituales:

- Dolor de cabeza.
- Sofocos.
- Sensación de mareo o ganas de vomitar.
- Erupciones en la piel.
- Dolor o dificultad para mover las articulaciones.
- Inflamación de las articulaciones.
- Debilidad.
- Pérdida de componentes de los huesos u osteoporosis.
- Depresión.

Anastrozol puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Pérdida de ganas de comer.
- Aumento de colesterol.
- Sueño.
- Hormigueo, dolor, sensación de frío y debilidad en las manos.
- Cosquilleo, hormigueo o pérdida de sensibilidad en la piel.
- Diarrea.
- Vómitos.
- Problemas en el hígado.
- Caída de cabello.
- Reacción alérgica en cara, labios o lengua.
- Dolor de huesos.
- Sequedad vaginal.



- Hemorragia vaginal.
- Dolor muscular.

Anastrozol puede tener otros efectos adversos raros o muy raros.
Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo
mientras tomas anastrozol
avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento,
avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

