



Irbesartán



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados, es decir, cuando te sientes mal.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el irbesartán?

Irbesartán es un medicamento que sirve para tratar la presión arterial alta o hipertensión.

Este medicamento protege el riñón en pacientes que tienen presión alta y diabetes tipo 2.



Avisos importantes

- No tomes bebidas alcohólicas cuando tomes irbesartán.
- Consulta a tu médico si tomas irbesartán y estás embarazada, crees que puedes estar embarazada o estás dando el pecho.
- Cuando tienes presión arterial alta puedes tener mareos o fatiga.



Si presentas estos síntomas, consulta a tu médico antes de conducir o utilizar máquinas.

- El médico puede realizar análisis de sangre para llevar un control del tratamiento.



¿Puedo tomar irbesartán?

Nunca tomes irbesartán

- Cuando tienes alergia al irbesartán o algún componente de los que forman este medicamento.
- Cuando estás embarazada de más de 3 meses.
- Cuando tienes diabetes o problemas en el riñón y tomas un medicamento que tiene aliskirén.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar irbesartán

- Cuando tienes vómitos o diarrea excesivos.
- Cuando tienes problemas de riñones.
- Cuando tienes problemas de corazón.
- Cuando tienes una enfermedad diabética del riñón.
- Cuando tienes niveles bajos de azúcar en sangre.
- Si vas a ser operado o te van a poner anestesia.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar irbesartán

- Si estás tomando medicamentos para tratar la tensión alta.
- Medicamentos que tienen aliskirén.



¿Cuánto irbesartán puedo tomar?

Tu médico te indicará cuánto irbesartán debes tomar y cuánto tiempo durará el tratamiento.

Lo habitual es tomar 1 dosis de 150 miligramos 1 vez al día.

El médico puede aumentar la dosis hasta 300 miligramos al día.

Los pacientes que tienen la tensión alta y diabetes tipo 2 de riñón toman 300 miligramos 1 vez al día.

El médico puede recomendar una dosis más pequeña en pacientes con un tratamiento que se llama hemodiálisis o mayores de 75 años



¿Cómo debo tomar irbesartán?

Irbesartán puede tomarse como comprimidos.

Hay que tragarlos enteros con un poco de agua, sin masticar ni triturar.

Puedes tomarlo con o sin comidas.



Deja de tomar irbesartán de forma inmediata

Deja de tomar irbesartán y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Reacción alérgica en la piel grave con erupción de la piel y picor, inflamación de la cara, labios o lengua.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar irbesartán?

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más irbesartán del debido?

Cuando tienes una sobredosis,

quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas irbesartán y cuánto has tomado.



Efectos adversos de irbesartán

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Irbesartán puede tener los siguientes efectos adversos muy habituales:

- Aumento de los niveles de potasio en los análisis de sangre en pacientes que tienen la tensión alta y diabetes tipo 2 de riñón.

Irbesartán puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Mareos
- Náuseas y vómitos.
- Fatiga.



Salud más fácil

- Aumento de enzima creatin-cinasa en los análisis de sangre.

En pacientes que tienen la tensión alta y diabetes tipo 2 de riñón pueden tener los siguientes efectos adversos habituales

- Mareos al ponerse de pie.
- Tensión baja.
- Dolor muscular.
- Dolor de articulaciones.
- Bajos niveles de proteína en células rojas de la sangre.

Irbesartán puede tener otros efectos adversos raros o muy raros. Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas irbesartán avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

