



Levetiracetam



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el levetiracetam?

El levetiracetam es un medicamento contra los ataques de epilepsia.

La epilepsia es una enfermedad que afecta a las neuronas de algunas zonas del cerebro. Produce ataques con movimientos rápidos, llamados convulsiones.

Las personas con esta enfermedad también pueden perder el conocimiento cuando tienen un ataque de epilepsia.

Levetiracetam es un medicamento que puede tomarse solo o con otros medicamentos:

- Levetiracetam se toma solo, sin otros medicamentos: cuando la persona es adulta o es mayor de 16 años, y le acaban de detectar que tiene epilepsia.



Salud más fácil

Levetiracetam es utilizado cuando la epilepsia afecta solo a un lado del cerebro, pero puede llegar a otras zonas del cerebro. Tu médico te receta levetiracetam para reducir los ataques epilépticos.

- Levetiracetam se toma con otros medicamentos:
 - Cuando el ataque epiléptico comienza solo en una zona. En este caso lo pueden tomar adultos y niños a partir de 1 mes.
 - Cuando los ataques provocan movimientos de un músculo o de varios y los ataques duran poco. En este caso lo pueden tomar adultos y adolescentes mayores de 12 años.
 - Cuando los ataques son más largos y puedes llegar a perder el conocimiento, se piensa que la causa de la epilepsia es hereditaria. En este caso lo pueden tomar adultos y adolescentes mayores de 12 años.



Avisos importantes

- No dejes de tomar levetiracetam antes de que te lo diga el médico. Cuando dejas de tomar levetiracetam antes de tiempo, puedes tener más ataques epilépticos.
- Avisa a tu médico en el caso de tomar levetiracetam y notes que:
 - Tienes pensamientos raros.
 - Te molesta cualquier cosa.



Salud más fácil

- Reaccionas de forma agresiva.
- Tienes cambios de ánimo.
- Avisa a tu médico si tienes más ataques epilépticos o son más graves.

Es raro que esta situación ocurra,
pero puede ocurrir al comenzar el tratamiento
o al subir las dosis del medicamento.



¿Puedo tomar levetiracetam?

Nunca tomes levetiracetam

- Cuando tienes alergia al levetiracetam.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar levetiracetam

- Tienes problemas de riñón.
- La persona que va a tomar levetiracetam es un niño y has notado que no crece tanto como debería.
- Tienes familiares o has tenido familiares con problemas de corazón.
- Tienes depresión, piensas en hacerte daño o en el suicidio.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar levetiracetam

- Laxantes como el macrogol.
Laxante es un medicamento
que sirve para aliviar y prevenir el estreñimiento.

Avisa a tu médico cuando estás tomando otro medicamento.



¿Cuánto levetiracetam puedo tomar?

Tu médico te indicará cuánta cantidad debes tomar y durante cuánto tiempo.

Adultos y adolescentes mayores de 12 años que pesan más de 50 kilos.

Lo habitual es tomar entre 1.000 miligramos y 3.000 miligramos al día.

Cuando empieces a tomar levetiracetam, tu médico te mandará una dosis más baja durante 2 semanas.

Después te mandará la dosis que debes tomar a diario.

Adolescentes entre 12 y 17 años con un peso de 50 kilos o menos.

Tu médico te mandará la dosis más apropiada a tu peso.

Bebés entre 1 mes y 23 meses que toman el pecho o el biberón y niños entre 2 y 11 años que pesan menos de 50 kilos.

Tu médico te mandará la dosis más apropiada al peso y a la edad.



¿Cómo debo tomar levetiracetam?

Levetiracetam puede tomarse en comprimidos.

Hay que tragarlos con un vaso de agua y sin masticar.

Toma levetiracetam 2 veces al día,

un comprimido por la mañana

y otro por la noche.

Intenta tomar los comprimidos siempre a la misma hora del día.

Puedes tomar levetiracetam con alimentos

o sin alimentos.

Este medicamento también puede tomarse en solución oral,
es decir, en gotas.

Levetiracetam en solución oral es recomendable
para bebés y niños menores de 6 años,
y para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años,
que pesan menos de 50 kilos.

¿Cómo debes dejar de tomar levetiracetam?

El tratamiento con levetiracetam dura mucho tiempo.

Toma el medicamento todo el tiempo

que te mande tu médico.

Debes dejar de tomar levetiracetam poco a poco
para no tener ataques epilépticos.



Deja de tomar levetiracetam de forma inmediata

Deja de tomar levetiracetam y avisa enseguida al médico en los siguientes casos:

- Te sientes débil, con mareos o con problemas para respirar.
- Notas la cara hinchada, la lengua o la garganta.
- Tienes gripe.
- Tienes irritación o granitos en la cara.
- Orinas poca cantidad.
- Te sientes cansado.
- Tienes ganas de vomitar.
- Vomitas.
- Notas los brazos, las piernas o los pies hinchados.
- Te aparecen posibles ampollas alrededor de la boca, nariz, ojos o en los genitales.
- Caída de la piel en grandes zonas del cuerpo.
- Notas cambios mentales graves o tienes comportamientos raros.
- Te sientes confundido, notas pérdidas de memoria o tienes movimientos involuntarios, por ejemplo, un tic en el ojo.

Levetiracetam puede tener otros efectos muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas levetiracetam avisa de forma urgente a médico o al farmacéutico.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar levetiracetam?

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más levetiracetam del debido?

Cuando tienes una sobredosis,
quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- Al médico o al farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20.

Explica que tomas levetiracetam y cuánto has tomado.

Los efectos de tomar más levetiracetam de lo debido son:

- Nerviosismo.
- Agresividad.
- Estar adormecido.
- Tener problemas para respirar.
- Entrar en coma.



Efectos adversos de levetiracetam

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento, porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Los efectos adversos muy habituales de levetiracetam son:

- Enfermedad del aparato respiratorio causada por un virus o por una bacteria.
- Sensación de sueño.
- Dolor de cabeza.

Los efectos adversos habituales de levetiracetam son:

- Depresión.
- Agresividad.
- Convulsiones, problemas de equilibrio y mareos.
- Falta de energía.
- Temblores.
- Tos.
- Sensación de mareos, es decir, notas que la habitación da vueltas.
- Náuseas y vómitos.
- Estar nervioso.
- Tener pocas ganas de comer.
- Tener problemas para dormir.
- Dolor de abdomen, diarrea, náuseas.
- Tener problemas para hacer la digestión.
- Irritación o granitos.
- Cansancio.



Levetiracetam puede tener otros efectos adversos raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo

mientras tomas levetiracetam,

avisa de forma urgente al médico o al farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento,

avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.

La fecha de caducidad suele aparecer con el número del mes y el año junto a las letras CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

SANDOZ

Con el aval de

