



Rabeprazol



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el rabeprazol?

El rabeprazol es un medicamento que reduce el ácido del estómago. Este medicamento calma los síntomas producidos por el reflujo en el estómago. El reflujo es la subida del ácido del estómago hacia la garganta.

Rabeprazol se utiliza para tratar:

- Úlceras en el estómago o en el intestino.
- Ardor en el estómago.
El ardor es una sensación de quemazón que sube del estómago hacia la garganta.
- Regurgitación o sabor agrio en la boca.
- El aumento de ácido del estómago.



- Infecciones por helicobacter pylori

El helicobacter pylori es una bacteria que causa infección en el estómago.

En este caso el médico te mandará tomar rabeprazol junto con un antibiótico.

Este medicamento es para mayores de 18 años.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes rabeprazol.
- Cuando lleves más de 1 año tomando este medicamento debes ir al médico cada cierto tiempo.
- Avisa a tu médico cuando tienes problemas de hígado.
Tu médico controlará cómo funciona tu hígado durante el tratamiento.
- Avisa a tu médico si estás tomando rabeprazol y te sale sarpullido en la piel o tienes dolor en las articulaciones.
- Durante el tratamiento con rabeprazol tu riñón puede hincharse.

Esto puede provocar:

- Menos cantidad de orina.
- Sangre en la orina.
- Fiebre.
- Sarpullido en la piel.
- Articulaciones más rígidas.



Salud más fácil

- Tomar rabeprazol durante más de 1 año aumenta un poco el riesgo de que la cadera, las muñecas, o la columna vertebral, puedan romperse.
- Tomar rabeprazol más de 3 meses puede causar falta de magnesio en tu cuerpo. El magnesio es un nutriente necesario para que el cuerpo este sano. La falta de magnesio causa:
 - Cansancio
 - Movimientos musculares que no puedes controlar.
 - Desorientación.
 - Convulsiones.
 - Mareos.
 - Aumento del ritmo del corazón.



¿Puedo tomar rabeprazol?

Nunca tomes rabeprazol

- Cuando tienes alergia al rabeprazol.
- Si estás embarazada o crees que puedes estarlo.
- Si eres madre y estás dando el pecho.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar rabeprazol

- Tumor en el estómago.
- Problemas en el hígado.
- Problemas por falta de B12 en el cuerpo. La B12 es una vitamina necesaria



Salud más fácil

para el funcionamiento del cerebro,
y sistema nervioso y de algunas proteínas.

Rabeprazol dificulta la absorción de la vitamina B12.

- Te van a realizar un análisis de sangre.
- Problemas en la piel
al tomar otros medicamentos
que reducen la acidez del estómago.
- Problemas en los huesos.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar rabeprazol

- Contra el SIDA
- Corticoides, hormonas utilizadas
para tratar diferentes problemas.
Por ejemplo, para la artritis, el asma o alergias.



¿Cuánto rabeprazol puedo tomar?

- **Úlceras de intestino:**
Lo habitual es tomar una dosis de 20 miligramos
una vez al día antes de desayunar.
Normalmente durante 4 semanas.
Tu médico decidirá si continuas con el tratamiento
4 semanas más.
- **Úlceras de estómago:**
Lo habitual es tomar una dosis de 20 miligramos
una vez al día antes de desayunar.
Normalmente durante 6 semanas.
Tu médico decidirá si continuas con el tratamiento
6 semanas más.



Salud más fácil

- **ERGE:**

ERGE es una enfermedad que causa úlceras en el estómago.

Lo habitual es tomar una dosis de 20 miligramos una vez al día durante 4 u 8 semanas.

- **Cuando el tratamiento por ERGE es largo:**

Lo habitual es tomar una dosis 10 miligramos o de 20 miligramos una vez al día.

En este caso debes ir al médico a revisiones cada cierto tiempo.

- **Cuando el ERGE es grave:**

Lo habitual es tomar una dosis 10 miligramos una vez al día durante 4 semanas.

Avisa a tu médico si no mejoras al terminar el tratamiento.

- **Aumento grave de ácido en el estómago:**

Lo habitual es tomar una dosis de 60 miligramos una vez al día, pero tu médico puede subirte la dosis.

Tu médico te dirá cuántos comprimidos tienes que tomar, cuando tomarlos y durante cuánto tiempo.

- **Infección por la bacteria *Helicobacter pylori*:**

Lo habitual es tomar una dosis de 20 miligramos 2 veces al día, junto con otros 2 medicamentos.

La combinación de medicamentos recomendada es:

Rabeprazol 20 miligramos + claritromicina 500 miligramos

+ amoxicilina 1 miligramo,

tomados todos juntos 2 veces al día,

durante 7 días.



¿Cómo debo tomar rabeprazol?

Rabeprazol puede tomarse como comprimidos.

Hay que tragarlos enteros con un vaso de agua y sin masticar.

Si solo tomas rabeprazol una vez al día,
es recomendable tomarlo antes del desayuno.

¿Cómo debo dejar de tomar rabeprazol?

Aunque notes mejoría
es importante no dejar el tratamiento
hasta que te lo diga tu médico.



Deja de tomar rabeprazol de forma inmediata

Deja de tomar rabeprazol y acude al médico
cuando tengas estos síntomas:

- Diarrea grave, con fiebre
y dolor en el abdomen.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo
mientras tomas rabeprazol,
avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar rabeprazol?

Es importante que tomes rabeprazol todos los días.

Si olvidas tomar una o más dosis, tómala lo antes posible
y continúa con el tratamiento como te mandó el médico.



¿Qué hago si he tomado más rabeprazol del debido?

Cuando tienes una sobredosis,
quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas rabeprazol y cuánto has tomado.

Avisa enseguida de la sobredosis, aunque no sientas nada.



Efectos adversos del rabeprazol

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento
porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Los efectos adversos muy habituales de rabeprazol son:

- Dolor de cabeza.
- Mareos.
- Problemas para dormir.
- Tos o dolor de garganta.
- Nariz taponada o goteo de líquido por la nariz.
- Diarrea o estreñimiento.
- Náuseas o vómitos.
- Dolor de estómago.
- Gases.
- Dolor en general.
- Dolor de espalda.
- Infección.
- Síntomas parecidos a la gripe.
- Sentirte débil.



- Tumores benignos en el estómago.

Los tumores benignos no producen cáncer.

Rabeprazol puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas rabeprazol, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

