



Tadalafilo



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el tadalafilo?

El tadalafilo es un medicamento que se usa para los problemas de erección o disfunción eréctil en hombres adultos.

Estos problemas hacen que no tengas una erección en el momento de tener sexo.

Tadalafilo hace que la sangre

llegue mejor al pene

cuando estás excitado sexualmente.

Sólo funciona en el momento en el que estés excitado sexualmente.

Tadalafilo también sirve para tratar:

- Síntomas de la enfermedad de la próstata. Con el paso de los años, el tamaño de la próstata aumenta y hace que los hombres tengan dificultades para orinar sensación de que la vejiga no se ha vaciado de forma completa, o necesidad de orinar con mayor frecuencia.



Avisos importantes

- Nunca bebas alcohol cuando tomes tadalafilo.
El consumo de alcohol puede afectar la capacidad de tener una erección y puede disminuir la presión sanguínea. Esto aumenta el riesgo de mareos.
- Avisa a tu médico si estás en tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata.
- Avisa a tu médico si tienes problemas de corazón.
- Avisa a tu médico si tienes alteración de los glóbulos rojos.
- Avisa a tu médico si tienes cáncer de médula ósea o cáncer de las células sanguíneas.
- Informa de cualquier deformación en el pene.
- Avisa a tu médico si tienes problemas graves de riñón y de hígado.
- Avisa a tu médico si notas pérdida de visión o de audición mientras tomas tadalafilo.



¿Puedo tomar tadalafilo?

Nunca tomes tadalafilo

- Cuando tienes alergia a tadalafilo.
- Cuando estás tomando nitratos, para tratar el dolor de la angina de pecho.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar tadalafilo

- Cuando tienes enfermedad grave del corazón.
- Cuando has sufrido un ataque cardiaco hace poco.
- Cuando has sufrido un ictus hace poco.
- Cuando tienes tensión alta o tensión baja y no controlada.



Salud más fácil

- Cuando alguna vez has tenido pérdida de visión.
- Cuando tienes alteraciones en los glóbulos rojos.
- Cuando tienes cáncer de médula ósea o leucemia.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar tadalafilo

- Para la tensión arterial.
- Para los síntomas o al tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata.
- Riociguat, que sirve para tratar la tensión alta en los pulmones.
- Para las infecciones fúngicas, es decir, infecciones causadas por hongos.
- Para el SIDA.
- Anticonvulsivos.
- Otros medicamentos para la disfunción eréctil.
- Antibacterianos.



¿Cuánto tadalafilo puedo tomar?

- Hombres adultos
La dosis habitual es un comprimido de 5 miligramos 1 vez al día.
Tu médico puede ajustarte la dosis.
- Para el tratamiento de hiperplasia benigna de próstata
La dosis habitual es un comprimido de 5 miligramos 1 vez al día.
- Para el tratamiento de la disfunción eréctil
La dosis habitual es un comprimido de 5 miligramos 1 vez al día.

Tadalafilo no se debe usar en niños ni en adolescentes menores de 18 años.



¿Cómo debo tomar tadalafilo?

Tadalafilo puede tomarse como comprimidos.

Hay que tragarlos enteros con un poco de agua,
sin masticar ni triturar.

Toma el medicamento con o sin alimentos.



Deja de tomar tadalafilo de forma inmediata

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo
mientras tomas tadalafilo,
avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Deja de tomar tadalafilo y avisa enseguida a tu médico
en los siguientes casos:

- Si tienes una reacción alérgica con erupciones.
- Si sientes dolor de pecho.
- Si tienes una erección dolorosa y muy larga.
- Si pierdes la visión o tienes visión borrosa.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar tadalafilo?

Si tomas tadalafilo una vez al día,
toma tu dosis tan pronto como te acuerdes.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.

No tome tadalafilo más de una vez al día.



¿Qué hago si he tomado más tadalafilo del debido?

Cuando tienes una sobredosis,
quiere decir que tomaste más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas tadalafilo y cuánto tomaste.



Efectos adversos de tadalafilo

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento
porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Tadalafilo puede tener los siguientes efectos adversos frecuentes:

- Dolor de cabeza.
- Dolor de espalda.
- Dolores musculares.
- Dolor en los brazos y en las piernas.
- La cara se te pone roja.
- Congestión nasal.
- Indigestión.

Tadalafilo puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual,
rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo
mientras tomas tadalafilo,
avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento,
avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Fertilidad

Observamos en algunos hombres la reducción de esperma.

Es poco probable que estos efectos produzcan una falta de fertilidad.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

