



Celecoxib



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el celecoxib?

El celecoxib es un medicamento que sirve para calmar los síntomas de la artritis, de la artrosis y de la espondilitis anquilosante.

La espondilitis anquilosante es una enfermedad de la columna vertebral.

La artritis y la artrosis son enfermedades que causan hinchazón y dolor en las articulaciones.

Estas enfermedades ocurren cuando nuestro cuerpo genera mucha cantidad de una hormona que provoca hinchazón y dolor en las articulaciones.

Celecoxib es un antiinflamatorio no esteroide que reduce la cantidad de esta hormona.

Este tipo de antiinflamatorios son medicamentos que reducen la hinchazón y calman el dolor.



Salud más fácil

Este medicamento es para personas mayores de 18 años.



Avisos importantes

- Cuando tomes celecoxib nunca bebas bebidas alcohólicas.
- Desde que comienzas el tratamiento hasta que notas mejoría pueden pasar varios días.
- En caso de tener problemas de corazón, riñón o hígado avisa a tu médico.
Tu médico te controlará y te mandará la dosis adecuada.
- También te controlará cuando tengas más de 65 años.
- El celecoxib puede ocultar o esconder la fiebre y otros síntomas causados por una infección o inflamación.
- Este medicamento puede subir tu presión arterial.
- Este medicamento dificulta el quedarse embarazada.



¿Puedo tomar celecoxib?

Nunca tomes celecoxib

- Si tienes alergia al celecoxib.
- Si tienes alergia a algunos antibióticos.
- Si tienes úlceras o heridas en el estómago o en el intestino.
- Si al tomar antiinflamatorios has tenido alergia o has sufrido problemas de salud, por ejemplo, asma, tumores o congestión en la nariz.
- Si estás embarazada o intentando quedarte embarazada.
- Si eres madre y estás dando el pecho.



Salud más fácil

- Si tienes problemas de hígado.
- Si tienes problema de riñón.
- Si tienen el intestino hinchado.
- Si tienes problemas de corazón.
- Si has sufrido un ataque o infarto cerebral.
- Cuando tienes o has tenido problemas para que la sangre circule bien por tu cuerpo.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar celecoxib

- Has tenido úlceras o heridas en el estómago o en el intestino.
- Fumas.
- Tienes diabetes.
- Tienes la tensión o el colesterol altos.
- Retienes líquidos.
- Estás deshidratado.
- Has tenido una reacción alérgica por un medicamento.
- Tienes una infección.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar celcoxib

- Para tratar la tos.
- Contra la presión arterial alta.
- Para ayudar al corazón a bombear la sangre.
- Para tratar infecciones por hongos o bacterias.
- Contra la coagulación de la sangre, es decir, medicamentos que mantienen la sangre líquida.
- Contra la inflamación, el asma o las alergias.
- Contra el dolor o la fiebre.
- Contra la depresión.
- Para regular el latido del corazón.



Salud más fácil

- Para mejorar el sueño.
- Contra el insomnio y la ansiedad.
- Para tratar problemas de salud mental.
- Contra la psoriasis y la leucemia.

La psoriasis es una enfermedad de la piel que causa un sarpullido y produce picor.

La leucemia es una enfermedad de la parte de dentro de los huesos.

- Contra la epilepsia.
- Contra el rechazo de trasplantes.



¿Cuánto celecoxib puedo tomar?

Tu médico te indicará cuánto celecoxib debes tomar y cuánto tiempo durará el tratamiento.

Lo habitual es tomar 1 comprimido al día de 200 miligramos o 2 comprimidos al día de 100 miligramos.

Tu médico puede subirte la dosis a 400 miligramos al día cuando sea necesario.

Nunca tomes más de 400 miligramos de celecoxib al día.

Tu médico te dirá que dosis debes tomar.

Celecoxib puede causar problemas en el corazón, por eso, lo habitual es tomar la dosis más baja y solo el tiempo necesario.



¿Cómo debo tomar celecoxib?

Celecoxib puede tomarse en cápsulas.

Tome celecoxib a cualquier hora del día,

Intenta que todos los días sea a la misma hora,

por ejemplo, cuando te tomas a las 10 de la mañana,

el resto de los días también tienes que tomarlo a esa hora.

Puedes tomarlo con o sin alimentos.

Cuando tienes problemas para tragar la cápsula

puedes abrirla y echar el contenido

en una cuchara con algún alimento

y tomarla a continuación.

Debes abrirla la cápsula con cuidado

y no masticar ni aplastar el contenido.

Cómo debo dejar de tomar celecoxib

Toma el medicamento todo el tiempo

que tú médico te mande.

Dejar de tomar el medicamento de forma inmediata

puede provocar que empeores.

Tu médico bajará la dosis del medicamento poco a poco

hasta terminar el tratamiento.



Deja de tomar celecoxib de forma inmediata

Deja de tomar celecoxib y avisa enseguida a tu médico

Cuando tienes algunos de los siguientes síntomas:

- Tienes una reacción alérgica como:
 - > Sarpullido en la piel
 - > Hinchazón de la cara.
 - > Problemas para respirar.
- Tienes dolor en el pecho.
- Tienes sangre en el vómito o en las heces.
- Tienes ganas de vomitar, diarrea o la piel o los ojos se ponen de color amarillos.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar celecoxib?

Tómate la cápsula en cuanto te acuerdes.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más celecoxib del debido?

Cuando tienes una sobredosis,

quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- Al médico o al farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas celecoxib y cuánto has tomado.



Efectos adversos de celecoxib

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Los efectos adversos que nombramos a continuación son efectos producidos en personas que han tomado cantidades altas de celecoxib y durante bastante tiempo.

Celecoxib puede tener los siguientes efectos adversos muy habituales:

- Presión arterial alta.

Celecoxib puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Ataque al corazón.
- Hinchazón de tobillos, piernas o manos, por retener líquidos.
- Infección al orinar.
- Problemas para respirar.
- Nariz taponada o moqueo.
- Dolor de garganta, tos o resfriado.
- Sensación de tener gripe.
- Mareo, dificultad para dormir.
- Vómitos y ganas de vomitar.
- Dolor de estómago, diarrea o gases.
- Problemas al tragar.
- Sarpullido y picor en la piel.
- Músculos rígidos.
- Dolor de cabeza.
- Dolor de las articulaciones.



Salud más fácil

- Tus alergias pueden empeoran.

Celecoxib puede tener otros efectos adversos raros o muy raros.

Cuando sientas algo anormal en tu cuerpo mientras tomas a celecoxib avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento,
avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

