



Irbesartán / Hidroclorotiazida



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el irbesartán / hidroclorotiazida?

Irbesartán es un medicamento que sirve para relajar las venas y reducir la tensión arterial.

Hidroclorotiazida es un medicamento diurético que sirve para que el cuerpo elimine el exceso de líquido.

Irbesartán / Hidroclorotiazida juntos sirven para bajar la tensión arterial alta.

Este tratamiento sirve cuando los medicamentos solos no controlan la tensión arterial de forma adecuada.



Avisos importantes



- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes irbesartán / hidroclorotiazida.
- Este medicamento no está recomendado a personas menores de 18 años.
- Este medicamento no está recomendado a mujeres embarazadas porque puede causar daños al feto.
- Protege tu piel del sol mientras tomas irbesartán / hidroclorotiazida.



¿Puedo tomar irbesartán / hidroclorotiazida?

Nunca tomes irbesartán / hidroclorotiazida

- Cuando tienes alergia al irbesartán o a la hidroclorotiazida o a alguno de sus componentes.
- Cuando eres alérgico a los medicamentos que se llaman sulfonamidas.
- Cuando estás embarazada de más de 3 meses.
- Cuando tienes problemas graves de riñón.
- Cuando tienes problemas graves de hígado.
- Cuando tienes niveles altos de calcio o niveles bajos de potasio en la sangre.
- Cuando tienes diabetes o problemas de riñón y tomas medicamentos que tienen aliskirén.



Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar irbesartán / hidroclorotiazida

- Síndrome de Conn, es decir,
un tumor en las glándulas cerca del riñón
que provoca debilidad muscular, sed
y orinar de forma frecuente.
- Problemas de hígado.
- Problemas de riñón.
- Tomas diuréticos para eliminar líquidos.
- Sigues una dieta baja en sal.
- Vómitos o diarreas.
- Has tenido un infarto.
- Arterias estrechas en los riñones o el corazón.
- Tienes un trasplante de riñón.
- Lupus, es decir,
una enfermedad que afecta al sistema inmune
y causa dolor en las articulaciones, fiebre y erupciones en la piel.
El sistema inmunológico es el sistema
que se encarga de defender al cuerpo
de sustancias peligrosas.
- Niveles altos de calcio o potasio.
- Si te van a poner anestesia antes de una cirugía.
Incluso si es en el dentista.
- Cuando tienes sed, sequedad de boca, debilidad,
sensación de sueño, dolores musculares,
náuseas, vómitos o latido del corazón acelerado.
- Cuando sientes que ves peor
o te duelen los ojos.
- Tienes o has tenido cáncer de piel
u otras lesiones en la piel por el tratamiento.
- Problemas respiratorios o pulmonares.



Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar irbesartán / hidroclorotiazida

- Litio para el tratamiento de enfermedades mentales como manía o depresión.
- Inhibidores de la encima convertidora de angiotensina o IECA.
- Aliskirén.
- Suplementos de potasio.
- Suplementos de sal que tengan potasio.
- Medicamentos diuréticos.
- Laxantes, que son medicamentos que ayudan a ir al baño.
- Para tratar la enfermedad de la gota.
- Suplementos de vitamina D.
- Para el control del ritmo cardiaco.
- Para la diabetes.
- Esteroides.
- Para el tratamiento del cáncer.
- Analgésicos.
- Para la artritis.
- Para reducir el colesterol en la sangre.
- Para tratar la epilepsia.



¿Cuánto irbesartán / hidroclorotiazida puedo tomar?

Lo habitual es tomar 1 comprimido 1 vez al día.

El médico te indicará las instrucciones para tomar este medicamento cuando cambies de otros medicamentos a irbesartán / hidroclorotiazida.



¿Cómo debo tomar irbesartán / hidroclorotiazida?

Toma el comprimido de irbesartán / hidroclorotiazida con un vaso de agua todos los días sobre la misma hora. Puedes tomarlo con o sin alimentos.

¿Cómo debo dejar de tomar irbesartán / hidroclorotiazida?

Consulta a tu médico antes de dejar de tomar irbesartán / hidroclorotiazida.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar irbesartán / hidroclorotiazida?

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más irbesartán / hidroclorotiazida del debido?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas irbesartán / hidroclorotiazida y cuánto has tomado.



Efectos adversos del irbesartán / hidroclorotiazida

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Tienes hinchada la cara, labios, boca, lengua y garganta.
- Dificultad para respirar y mareos.
- Piel y ojos amarillos.

Irbesartán / hidroclorotiazida puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Mareos.
- Náuseas y vómitos.
- Cambios en las veces que vas a orinar.
- Fatiga.
- Subida de nitrógeno ureico, creatinina o creatin-quinasa en sangre.

Irbesartán / hidroclorotiazida puede tener también otros efectos adversos poco habituales, raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas irbesartán / hidroclorotiazida avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Conserva este medicamento en un sitio fresco

y dentro de su caja para protegerlo de la luz y la humedad.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.



Salud más fácil

Nunca lo tomes después de esa fecha.

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.
El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.
Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

