



Lamotrigina



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve lamotrigina?

La lamotrigina es un medicamento del grupo llamado antiepilépticos. Lamotrigina sirve para tratar la epilepsia y el trastorno bipolar.

La epilepsia es una enfermedad que afecta a las neuronas de algunas zonas del cerebro. El trastorno bipolar es una enfermedad mental donde la persona tiene cambios de humor muy bruscos, con momentos de excitación o euforia y periodos de depresión.

Para tratar la epilepsia, las personas mayores de 13 años pueden tomar lamotrigina sola o con otros medicamentos. Antes de los 12 años también pueden tomar lamotrigina con otros medicamentos.



La edad para tomar lamotrigina para tratar el trastorno bipolar es a partir de 18 años.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes lamotrigina.
- Sigue las instrucciones de tu médico para tomar lamotrigina.
- Los niños menores de 2 años no pueden tomar lamotrigina.
- Consulta con tu médico si tomas lamotrigina y aparecen problemas en la piel.
- Consulta con tu médico de forma urgente cuando tomas lamotrigina y después tienes meningitis. La meningitis es una inflamación de las meninges, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.
- Consulta a tu médico de forma urgente si tienes una reacción alérgica al tomar lamotrigina.
- Consulta con tu médico de forma urgente cuando tomas lamotrigina y tienes una reacción en la piel, fiebre, temblores o espasmos y confusión.
- Consulta a tu médico cuando tomas lamotrigina y tienes pensamientos de suicidio o hacerte daño a ti mismo. Si te sientes peor, habla con un familiar o amigo de confianza. Cuéntale que estás deprimido y pídele que te lea esta información. Pídeles que te digan si te ven mejor o peor en tu estado de ánimo o si han notado algún cambio en tu comportamiento que les preocupe.



- Consulta a tu médico de forma urgente si al tomar lamotrigina sufres crisis epilépticas más fuertes de lo habitual.
- Consulta a tu médico antes de tomar lamotrigina si vas a dar el pecho a tu hijo o tienes pensado hacerlo porque puede afectar al bebé.



¿Puedo tomar lamotrigina?

Nunca tomes lamotrigina

- Cuando tienes alergia a la lamotrigina o a algunas de las sustancias que la componen.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar lamotrigina.

- Problemas de riñón.
- Problemas de hígado.
- Síndrome de Brugada.
El Síndrome de Brugada es una enfermedad genética que afecta al corazón.
Si tomas lamotrigina y tienes esta enfermedad puedes tener problemas de corazón.
- Si tienes alguna enfermedad mental.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar lamotrigina.

- Otros medicamentos que contienen lamotrigina.
- Cualquier otro medicamento para la epilepsia o el tratamiento de salud mental.
- Medicamentos para dejar de fumar.
- Contra el sida.
- Antibióticos.
- Anticonceptivos, para no quedarse embarazada.



¿Cuánta lamotrigina puedo tomar?

Toma la cantidad de lamotrigina que te diga tu médico.

Tu médico puede tardar un tiempo
en encontrar la dosis adecuada para ti.

La dosis adecuada depende de:

- Tu edad.
- Si tomas otros medicamentos.
- Si tienes problemas de hígado o riñón.

La dosis adecuada para personas mayores de 13 años
es entre 100 miligramos y 400 miligramos al día.

La dosis adecuada para niños de 2 a 12 años
depende del peso del niño,
entre 1 miligramo a 15 miligramos por cada kilo.
Con una dosis máxima de 200 miligramos.

Los niños menores de 2 años no pueden tomar lamotrigina.



¿Cómo debo tomar lamotrigina?

Lo habitual es tomar una dosis de lamotrigina
1 o 2 veces al día, según te diga tu médico.
Toma el comprimido completo con o sin alimentos.

Puedes tragar la pastilla entera, masticarla
o deshacerla en agua y bebértela.



¿Cómo debes dejar de tomar lamotrigina?

No dejes de tomar lamotrigina de forma inmediata.

Sigue las indicaciones de tu médico para dejar de tomar lamotrigina.

Cuando estás tomando lamotrigina para la epilepsia
tu médico reducirá la dosis poco a poco durante 2 semanas.

Si dejas de tomar lamotrigina de repente
tendrás de nuevo síntomas de epilepsia
o incluso puedes estar peor.

Cuando estás tomando lamotrigina para el trastorno bipolar
no hace falta dejar de tomar la dosis poco a poco.



Deja de tomar lamotrigina de forma inmediata

Deja de tomar lamotrigina y contacta urgente con tu médico cuando:

- Sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas lamotrigina, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.
- Tienes una reacción alérgica como erupciones en la piel o enrojecimiento.
- Heridas en la boca, garganta, nariz o genitales. Los genitales son los órganos sexuales externos.
- Dolor en la boca.
- Ojos rojos o hinchados.
- Fiebre.
- Hinchazón de cara o cuello.
- Sangrado o aparición de moratones.
- Dolor de garganta.
- Alteración de algunos valores en análisis de sangre.
- Afectación del hígado o riñón.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar lamotrigina?

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada. Toma la siguiente dosis a la hora de siempre.

Si te olvidas de tomar lamotrigina varias veces consulta con tu médico si tienes que empezar de nuevo el tratamiento.



¿Qué hago si he tomado más lamotrigina del debido?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas prednisolona y cuánto has tomado.

Los síntomas que puedes tener con una sobredosis son:

- Movimientos rápidos e incontrolables de ojos.
- Pérdida de equilibrio.
- Cambios en el ritmo de latidos del corazón.
- Pérdida de conciencia, convulsiones o entrar en estado de coma.



Efectos adversos de lamotrigina

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Lamotrigina puede tener los siguientes efectos adversos frecuentes:

- Dolor de cabeza.
- Problemas en la piel como erupciones.
- Agresividad o mal humor.
- Mareo.
- Temblores, espasmos.

Un espasmo es una contracción involuntaria de los músculos.

- Dificultades para dormir.
- Nerviosismo.
- Diarrea.
- Boca seca.
- Ganas de vomitar y vómitos.
- Cansancio.
- Dolor de espalda

Lamotrigina puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas lamotrigina, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

