



Lisinopril



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve lisinopril?

Lisinopril es un medicamento que sirve para que las venas se agranden y disminuya la tensión arterial. La tensión es la fuerza que realiza la sangre en las arterias. También facilita que el corazón bombee la sangre a todas las partes de tu cuerpo.

Lisinopril sirve para tratar:

- Presión arterial alta o hipertensión.
- Problemas del corazón.
- Cuando has tenido un infarto hace poco.
- Problemas de riñones en pacientes con hipertensión.



Avisos importantes

- Avisa a tu médico si estás embarazada, crees que puedes estar embarazada



Salud más fácil

o estás dando el pecho
y vas a tomar lisinopril.

- Avisa a tu médico,
si te van a operar o te van a operar en el dentista.
Puedes tener una bajada de presión arterial
con algunas anestесias y lisinopril.
- Algunas personas pueden sentirse mareadas o cansadas
cuando toman lisinopril.
Cuando te ocurra, no conduzcas o uses máquinas.



¿Puedo tomar lisinopril?

Nunca tomes lisinopril

- Cuando tienes alergia al lisinopril
o algún componente de este medicamento.
- Cuando tú o algún miembro de tu familia
ha tenido reacción alérgica
a otro medicamento que sea inhibidor del ECA.
como los medicamentos para el corazón.
- Tienes diabetes.
- Tienes problemas en los riñones.
- Tomas sacubitril o valsartán.
- Tienes tos seca desde que tomas lisinopril.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar lisinopril

- Tienes las arterias del corazón o la aorta muy estrecha.
- Tienes las arterias del riñón muy estrechas.
- Tienes problemas de corazón.
- Tienes problemas en las venas.
- Tienes presión arterial baja.



Salud más fácil

- Tienes una enfermedad de los riñones.
- Tienes una enfermedad en el hígado.
- Tienes diabetes.
- Has tenido diarrea o vómitos hace poco.
- Debes controlar la sal en tu dieta.
- Tienes colesterol alto.
- Eres de raza negra.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar lisinopril

- Para bajar la presión arterial.
- Un medicamento que se llama aliskirén.
- Para orinar más.
- Para problemas del corazón.
- Para tratar el dolor y la artritis.
- Aspirina.
- Para tratar la depresión y los trastornos mentales.
- Suplementos de potasio.
- Para tratar la diabetes.
- Para tratar el asma.
- Para tratar la congestión nasal.
- Para tratar el SIDA.
- Para tratar la enfermedad de la gota.
- Medicamentos que tienen sales de oro.
- Para problemas de coagulación de la sangre.
- Para prevenir que tu cuerpo rechace un órgano trasplantado.



¿Cuánto lisinopril puedo tomar?

Tu médico te indicará cuánto lisinopril debes tomar y cuánto tiempo durará el tratamiento.



La dosis de cada persona depende de su estado y de otros medicamentos que puedas tomar.



¿Cómo debo tomar lisinopril?

Lisinopril puede tomarse como comprimidos.

Hay que tragarlos enteros con agua.

Puedes tomar lisinopril con o sin alimentos.

Intenta tomar los comprimidos todos los días a la misma hora.

Ten cuidado cuando tomes las primeras dosis o cuando el médico aumente la dosis.

Puede bajar tu presión arterial y sentir mareos o vértigos.

¿Cómo debo dejar de tomar lisinopril?

El médico te indicará cuándo dejar de tomar el medicamento.

No dejes de tomar lisinopril aunque te encuentres bien.



Deja de tomar lisinopril de forma inmediata

Deja de tomar lisinopril y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Reacción alérgica grave
- Trastornos graves de piel, como erupción o enrojecimiento.
- Fiebre e irritación de garganta, faringe o boca.
- Problemas para orinar.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar lisinopril?

Toma la dosis lo más rápido que puedas.

Si te acuerdas cuando la hora es cercana de tu siguiente dosis, sáltate la dosis

y haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más lisinopril del debido?

Cuando tienes una sobredosis,

quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas lisinopril y cuánto has tomado.



Efectos adversos de lisinopril

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Lisinopril puede tener los siguientes efectos adversos muy habituales:

- Dolor de cabeza.
- Vértigos.
- Mareos.
- Diarrea.
- Tos seca constante.
- Vómitos.



- Problemas en los riñones.

Lisinopril puede tener otros efectos adversos raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas lisinopril

avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento,

avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.

La fecha de caducidad suele aparecer



Salud más fácil

con el número del mes y el año junto a las letras CAD.

La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

SANDOZ

Con el aval de

