



Moxifloxacino



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve moxifloxacino?

Moxifloxacino es un antibiótico que utilizamos para eliminar bacterias que causan infecciones.

Los antibióticos sirven para tratar infecciones provocadas por bacterias. No sirven para tratar infecciones provocadas por virus.

Las personas que pueden tomar moxifloxacino tienen que tener 18 años o más.

Moxifloxacino sirve para tratar estas infecciones:

- Infecciones de los senos paranasales. Los senos paranasales son unos orificios que están alrededor de la nariz.
- Infecciones de los pulmones.
- Infección del aparato genital femenino superior, como las trompas de Falopio o la membrana del útero.



- Infecciones de piel o tejidos blandos como músculos o tendones entre otros.
Los tendones son un tejido que une los músculos a los huesos.



Avisos importantes

- No guardes ni vuelvas a utilizar este medicamento después del tratamiento.
Si te sobra antibiótico devuélvelo a la farmacia.
No tires lo que te sobre al desagüe ni a la basura.
- Tu médico decidirá cuando el tratamiento con moxifloxacino es en sobre o en pastillas.
- Solo puedes tomar moxifloxacino si tienes más de 18 años.
- No tomes moxifloxacino si estas embarazada o estás dando el pecho.
- Consulta con tu médico si notas latidos de corazón de forma extraña al tomar moxifloxacino.
- Tomar moxifloxacino aumenta el riesgo de sufrir problemas de corazón.
- Consulta con tu médico si sientes síntomas de reacción alérgica al tomar moxifloxacino como presión en el pecho, mareo, ganas de vomitar.
- Tomar moxifloxacino puede provocar problemas de hígado.
- Consulta con tu médico si al tomar moxifloxacino tienes reacciones graves en la piel como erupciones, ampollas, enrojecimiento, hinchazón, entre otros.
- Consulta con tu médico si al tomar moxifloxacino tienes convulsiones.
- Consulta con tu médico si al tomar moxifloxacino tienes hormigueo, dolor o sensación de quemado en pies, piernas, manos o brazos.
- Tomar moxifloxacino puede provocar problemas de salud mental.
-



Salud más fácil

- Tomar moxifloxacino puede provocar diarrea.
Consulta a tu médico si es fuerte.
- Tomar moxifloxacino puede provocar dolor, inflamación o rotura en los tendones en las primeras 48 horas de iniciar la toma de moxifloxacino.
- Consulta con tu médico si al tomar moxifloxacino tienes problemas de visión.
- Tomar moxifloxacino puede provocar cambios en los niveles de azúcar en sangre.
- Tomar moxifloxacino puede provocar sensibilidad de la piel a la luz del sol.
Protégete y no te pongas al sol.



¿Puedo tomar moxifloxacino?

Nunca tomes moxifloxacino

- Cuando eres alérgico a moxifloxacino.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar moxifloxacino

- Enfermedad mental.
- Epilepsia.
- Miastenia gravis, que es una enfermedad que produce debilidad en los músculos.
- Problemas graves de hígado.
- Diabetes, que es mucho azúcar en la sangre o problemas de nivel de azúcar.
- Problemas de corazón o circulación de la sangre.
- Problemas graves en la piel como erupciones, ampollas...
- Lesiones en los tendones.
- Infección complicada en el aparato reproductor femenino.



Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar moxifloxacino

- Para problemas del corazón.
- Para algunas enfermedades mentales como antipsicóticos, antidepresivos.
- Para las infecciones por microbios.
Los microbios son organismos vivos de tamaño muy pequeño que solo se pueden ver con un microscopio.
- Antihistamínicos que son medicamentos que se usan para tratar los síntomas de las alergias, como estornudos, picor, lagrimeo y tos.
- Para ayudar a la digestión.
- Para la coagulación de la sangre, es decir, para mantenerla líquida.



¿Cuánta moxifloxacino puedo tomar?

La dosis recomendada para un adulto es una pastilla de 400 miligramos al día.

La duración del tratamiento depende de la infección.

Puede ser:

- Bronquitis crónica: de 5 a 10 días.
La bronquitis crónica es una enfermedad pulmonar que se caracteriza por una tos productiva que dura al menos 3 meses.
- Infecciones de pulmón: 10 días.
- Infecciones en senos paranasales: 7 días.
- Infecciones de aparato reproductor femenino: 14 días.

Si has comenzado el tratamiento con moxifloxacino en sobres y cambias a pastillas la duración del tratamiento será la siguiente:

- Infección de pulmón: de 7 a 14 días.
- Infección de piel y tejidos blandos: de 7 a 21 días.



Cuando estás tomando moxifloxacino en sobres puedes tomarlo en pastillas después de 6 días.



¿Cómo debo tomar moxifloxacino?

Toma moxifloxacino de la siguiente forma:

- Comprimidos o pastillas: tienes que tragarlo entero con medio vaso de agua.
- Con o sin alimentos.

¿Cómo debes dejar de tomar moxifloxacino?

No dejes de tomar moxifloxacino de forma inmediata.

Es importante que tomes el tratamiento completo.

Si dejas de tomar moxifloxacino antes de lo indicado

es posible que la infección no se cure y la infección pueda volver.

Incluso la bacteria se puede hacer resistente al antibiótico.

Consulta a tu médico si decides dejar moxifloxacino antes de terminar el tratamiento.



Deja de tomar moxifloxacino de forma inmediata

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas moxifloxacino, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Deja de tomar moxifloxacino y avisa a tu médico de forma inmediata si notas:

- Un ritmo del corazón demasiado rápido.
- Síntomas de inflamación de hígado como malestar, ojos amarillentos, orina oscura, picor de piel, dificultades para dormir.
- Erupciones graves en la piel.



Salud más fácil

- Fiebre.
- Desmayo por nivel de azúcar bajo.
- Inflamación de venas y arterias que producen manchas rojas en la piel y dolor en las articulaciones.
- Reacción alérgica grave como dificultad para respirar e hinchazón.
- Convulsiones o temblores.
- Problemas del sistema nervioso como hormigueo, debilidad, dolor o sensación de quemado en pies, piernas, manos o brazos.
- Depresión.
- Diarrea grave.
- Dolor e inflamación de tendones.
- Pérdida repentina de visión.
- Problemas de riñón con síntomas como menos orina, hinchazón de piernas, tobillos o pies, cansancio, ganas de vomitar, dificultad para respirar, confusión.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar moxifloxacino?

Toma la dosis lo antes posible ese mismo día.

Si no lo tomas ese día toma la dosis normal al día siguiente.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más moxifloxacino del debido?

Cuando tienes una sobredosis,

quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas moxifloxacino y cuánto has tomado.



Efectos adversos de moxifloxacino

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Moxifloxacino puede tener los siguientes efectos adversos frecuentes:

- Infecciones por bacterias u hongos resistentes a moxifloxacino.
- Dolor de cabeza.
- Mareo.
- Malestar o ganas de vomitar.
- Dolor de estómago.
- Resultados de electrocardiograma alterados.

Un electrocardiograma mide las señales eléctricas del corazón.

- Diarrea.
- Niveles alterados en sangre.

Moxifloxacino puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas moxifloxacino, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD o EXP.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

