



Pirfenidona



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve pirfenidona?

Pirfenidona es un medicamento que sirve para tratar la Fibrosis Pulmonar Idiopática en adultos. La Fibrosis Pulmonar Idiopática es una enfermedad en la que los pulmones se hinchan y se llenan de cicatrices. Las personas con fibrosis pulmonar idiopática tienen dificultades para respirar.

Pirfenidona ayuda a reducir las cicatrices y la hinchazón de los pulmones y a respirar mejor.



Avisos importantes

- Este medicamento no está recomendado a personas menores de 18 años.
- Este medicamento no está recomendado a mujeres embarazadas porque puede causar daños al feto.
- Este medicamento no está recomendado a mujeres que dan de mamar.
- El médico te realizará análisis de sangre para controlar tu estado mientras tomas pirfenidona.
- Evita y protege tu piel del sol mientras tomas pirfenidona.
- No debes fumar mientras tomas pirfenidona porque el tabaco reduce el efecto del medicamento.
- Pirfenidona puede causar mareo o cansancio.
Ten cuidado al realizar actividades que necesitan mucha atención o coordinación.
No conduzcas o uses máquinas.
- Pirfenidona puede causar pérdida de peso.
Tu médico vigilará tu peso cuando tomes este medicamento.
- No bebas zumo de pomelo cuando tomes pirfenidona.



¿Puedo tomar pirfenidona?

Nunca tomes pirfenidona

- Cuando tienes alergia a la pirfenidona o a alguno de sus componentes.
- Cuando has tenido una reacción en la piel con pirfenidona. Por ejemplo, hinchazón en cara, labios o lengua y dificultad para respirar.
- Cuando tienes depresión o el trastorno obsesivo compulsivo y tomas fluvoxamina.
- Cuando tienes una enfermedad grave o terminal del hígado.
- Cuando tienes una enfermedad grave o terminal del riñón y necesitas diálisis.

La diálisis es un tratamiento para limpiar la sangre del cuerpo.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar pirfenidona.

- Problemas de hígado.
- Problemas de riñón.
- Tensión arterial alta.
- Problemas del corazón.
- Niveles bajos de potasio en sangre.
- Ritmo cardíaco rápido, irregular o arritmias.
- Dificultades para respirar.
- Has engordado de forma rápida.
- Hinchazón en los pies, tobillos y piernas.
- Altos niveles de azúcar en sangre.



Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar pirfenidona

- Antibióticos como enoxacina, ciprofloxacino o rifampicina.
- Para tratar problemas del corazón, como amiodarona o propafenona.
- Cuando tienes depresión o trastorno obsesivo compulsivo y tomas fluvoxamina.
- Omeprazol para tratar problemas de estómago.



¿Cuánta pirfenidona puedo tomar?

Lo habitual es tomar:

- 267 miligramos en 1 comprimido
3 veces al día con alimentos durante la primera semana.
- 534 miligramos en 2 comprimidos
3 veces al día con alimentos durante la segunda semana.
- 801 miligramos en 1 o 3 comprimidos
3 veces al día con alimentos desde la tercera semana.

La dosis diaria de mantenimiento recomendada con alimentos es de 801 miligramos 3 veces al día.

El médico te indicará las instrucciones para tomar este medicamento.



¿Cómo debo tomar pirfenidona?

Toma los comprimidos de pirfenidona con un vaso de agua.

Debes tomar los comprimidos mientras tomas alimentos o después de tomarlos para bajar la sensación de mareos o náuseas.

¿Cómo debo dejar de tomar pirfenidona?

No debes dejar de tomar pirfenidona sin consultar al médico.

El médico te indicará cómo reducir la dosis cuando tienes efectos adversos, es decir, efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal. Por ejemplo, problemas de estómago, reacciones en la piel por la luz del sol, o cambios en los niveles de enzimas hepáticas en los análisis de sangre.



Deja de tomar pirfenidona de forma inmediata

Deja de tomar pirfenidona y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Labios, cara o lengua hinchados y con picor.
- Dificultad para respirar.
- Sensación de desmayo.
- Reacción alérgica grave.



Salud más fácil

- Tus ojos y piel se ponen de color amarillo.
- Orina oscura.
- Picor en la piel.
- Dolor en el lado derecho del abdomen.
- Pérdida de apetito.
- Hemorragia o hematomas.
- Sensación de cansancio.
- Manchas rojas en el cuerpo con ampollas.
- Llagas en la boca, garganta, nariz, genitales y ojos.
- Erupciones en la piel con fiebre o síntomas de gripe.
- Aumento de tamaño de los ganglios.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar pirfenidona?

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma al día siguiente a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más pirfenidona de la debida?

Cuando tienes una sobredosis,

quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas pirfenidona y cuánto has tomado.



Efectos adversos de la pirfenidona

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Pirfenidona puede tener

los siguientes efectos adversos muy habituales:

- Infección de garganta o vías respiratorias.
- Náuseas.
- Problemas de estómago como vómitos, reflujo ácido o estreñimiento.
- Diarrea.
- Pesadez de estómago.
- Pérdida de peso.
- Pérdida de ganas de comer.
- Problemas para dormir.
- Cansancio.
- Mareos.
- Dolor de cabeza.
- Dificultad para respirar.
- Tos.
- Dolor de articulaciones.

Pirfenidona puede tener

los siguientes efectos adversos habituales:

- Infección de vejiga.
- Sueño.
- Notas cambios en el sabor de los alimentos.
- Sofocos.
- Problemas de estómago como pesadez, dolor y molestia en el abdomen, ardor de estómago y gases.



Salud más fácil

- Análisis de sangre con niveles de enzimas hepáticas altos.
- Reacciones en la piel por el sol.
- Problemas en la piel como picor, irritación, piel roja, sequedad o erupciones.
- Dolor muscular.
- Debilidad o falta de energía.
- Dolor en el pecho.
- Quemaduras solares.

Pirfenidona puede tener también otros efectos adversos poco habituales, raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas pirfenidona avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños. Conserva este medicamento en un sitio fresco y dentro de su caja para protegerlo de la luz y la humedad.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.



Salud más fácil

Nunca lo tomes después de esa fecha.

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.

La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

