



Ropinirol



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el ropinirol?

Ropinirol es un medicamento que sirve para tratar la enfermedad de Parkinson.

Las personas con la enfermedad de Parkinson tienen niveles bajos de una sustancia que produce el cuerpo que se llama dopamina.

Ropinirol tiene un efecto igual a la dopamina y reduce los síntomas de la enfermedad del Parkinson.

La enfermedad del Parkinson afecta al sistema nervioso y a las partes del cuerpo que controlan los nervios.



Avisos importantes



Salud más fácil

- Avisa a tu médico cuando tomas ropinirol y empiezas o dejas de fumar.
- Este medicamento no está recomendado a personas menores de 18 años.
- Consulta a tu médico si estás embarazada o crees que puedes estar embarazada.
- Ropinirol puede provocar sueño o alucinaciones. Debes tener cuidado si vas a conducir o usar máquinas.
- Ropinirol contiene lactosa y aceite de ricino. Consulta a tu médico si tienes intolerancia a estos alimentos.



¿Puedo tomar ropinirol?

Nunca tomes ropinirol

- Cuando tienes alergia al ropinirol o a alguno de sus componentes.
- Cuando tienes problemas graves de riñón.
- Cuando tienes problemas graves de hígado.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar ropinirol

- Cuando estás embarazada o crees que puedes estarlo.
- Cuando estás dando de mamar.
- Cuando tienes menos de 18 años.
- Cuando tienes problemas graves de corazón.
- Cuando tienes un trastorno mental grave.
- Cuando tienes comportamientos extraños o impulsivos. Por ejemplo, necesidad de apostar dinero en el juego, comer demasiado o deseos sexuales en aumento.



Salud más fácil

- Cuando tienes intolerancias a algunos azúcares.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar ropinirol

- Para tratar la depresión que se llama fluvoxamina.
- Para trastornos mentales.
- Para tratamientos hormonales sustitutivos.
- Para tratar náuseas y acidez de estómago.
- Antibióticos que se llaman cirpofloxacino o enoxacino.
- Otros medicamentos para la enfermedad del Parkinson.



¿Cuánto ropinirol puedo tomar?

Lo habitual es tomar 1 comprimido de 2 miligramos una vez al día durante la primera semana.

En la segunda semana, el médico puede aumentar a 2 comprimidos, 4 miligramos, 1 vez al día.

El médico ajustará la dosis adecuada para ti.



¿Cómo debo tomar ropinirol?

Toma el comprimido de ropinirol

con un vaso de agua.

No rompas, mastiques o tritures el comprimido.

Los comprimidos son de liberación prolongada, es decir, tardan un tiempo en disolverse.

Cuando masticas, rompes o trituras el comprimido el medicamento entra en tu cuerpo más rápido y puedes recibir una dosis excesiva.

¿Cómo debo dejar de tomar ropinirol?

No dejes de tomar ropinirol de forma de repente porque la enfermedad de Parkinson puede empeorar de forma rápida.

Consulta a tu médico antes de dejar de tomar el medicamento.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar ropinirol?

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más ropinirol del debido?

Cuando tienes una sobredosis,
quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas ropinirol y cuánto has tomado.



Efectos adversos del ropinirol

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento
porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Ropinirol puede tener

los siguientes efectos adversos muy habituales:

- Sentir sueño.
- Náuseas.
- Desmayos.

Ropinirol puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Alucinaciones
- Vértigo.
- Sentir sueño.
- Vómitos.
- Dolor abdominal.
- Ardor de estómago.
- Dolor de estómago.
- Estreñimiento.
- Hinchazón de piernas, pies o manos.



Salud más fácil

Ropinirol puede tener también otros efectos adversos poco habituales, raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas ropinirol avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Conserva este medicamento en un sitio fresco

y dentro de su caja para protegerlo de la luz y la humedad.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.



Salud más fácil

Nunca lo tomes después de esa fecha.

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.
El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.
Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

