



Linagliptina



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve la linagliptina?

La linagliptina es un medicamento que sirve para tratar la diabetes tipo 2.

La diabetes es una enfermedad que produce un aumento de la cantidad de azúcar en la sangre.

La linagliptina ayuda a bajar los niveles altos de azúcar en la sangre.

Puedes utilizar linagliptina junto con otros medicamentos que sirven para lo mismo y es importante acompañarlo con una dieta adecuada y ejercicio físico.



Avisos importantes

- Los menores de 10 años no pueden tomar este medicamento, y no se recomienda para menores de 18 años.
- Avisa al médico si estás embarazada, crees que puedes estar embarazada o estás dando el pecho.
- Cuando tomes este medicamento junto con otros llamados sulfonilureas o insulina tus niveles de azúcar pueden bajar mucho y producir complicaciones.
En estos casos ten precaución cuando vas a conducir, utilizar máquinas o hacer actividades que necesiten que estés alerta.



¿Puedo tomar linagliptina?

Nunca tomes linagliptina

- Cuando tienes alergia a la linagliptina o algún componente de este medicamento.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar linagliptina

- Tienes diabetes tipo 1.
La diabetes tipo 1 es una enfermedad que hace que tu cuerpo no produzca una sustancia llamada insulina.
La insulina es la hormona que se produce en el páncreas y regula el azúcar en nuestra sangre.



Salud más fácil

- Tienes complicaciones de la diabetes, por ejemplo, pérdida de peso, náuseas o vómitos.
- Cuando tomas otros medicamentos para la diabetes porque tu nivel de azúcar puede bajar demasiado y tu médico tendrá que regular tu dosis.
- Tienes alergia a otros medicamentos que sirven para lo mismo.
- Tienes o has tenido una enfermedad en el páncreas.
- Tienes dolores de estómago graves que no desaparecen porque puede ser pancreatitis.
La pancreatitis es la inflamación del páncreas.
- Tienes lesiones o ampollas en la piel que pueden ser complicaciones de la enfermedad.

Avisa enseguida a tu médico cuando te salgan ampollas en la piel porque puede que te indique dejar de tomarlo.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar linagliptina

- Para tratar y controlar crisis de epilepsia o dolor continuado.
La epilepsia es una enfermedad que afecta al funcionamiento del cerebro.
- Antibiótico para tratar la tuberculosis.
La tuberculosis es una infección que afecta a los pulmones.



¿Cuánta linagliptina puedo tomar?

Lo habitual es tomar 1 comprimido de 5 miligramos
1 vez al día a la misma hora.

Tu médico puede mandarte otros medicamentos para la diabetes
para tomártelos juntos.



¿Cómo debo tomar linagliptina?

Puedes tomar linagliptina como comprimidos.
Hay que tragarlos enteros con un poco de agua.
Puedes tomarlo con alimentos o solo.

¿Cómo debo dejar de tomar linagliptina?

El médico te indicará la forma de reducir la dosis
o acabar el tratamiento.
Si interrumpes el tratamiento
puede subir tu nivel de azúcar en la sangre.



Deja de tomar linagliptina de forma inmediata

Deja de tomar linagliptina y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Aparecen signos de bajada de azúcar en sangre como:
 - Temblor,
 - sudor,
 - ansiedad,
 - visión borrosa,
 - cosquillas o picor en los labios,
 - palidez,



Salud más fácil

- cambios en el estado de ánimo y el humor,
 - confusión.
-
- Aparecen signos de alergia y mayor sensibilidad a este medicamento:
 - silbidos al respirar y falta de aire al respirar.
 - manchas en la piel, ronchas o picor.
 - cara, labios, boca o lengua hinchadas.
 - Dificultad para respirar o tragar.
-
- Inflamación del páncreas.
 - Dolor fuerte que no desaparece en el abdomen o espalda.
 - Ganas de vomitar y vómitos.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar linagliptina?

Toma la dosis tan pronto como te acuerdes.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más linagliptina de la debida?

Cuando tienes una sobredosis,

quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas linagliptina y cuánto has tomado.



Efectos adversos de linagliptina

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Puede tener los siguientes efectos adversos habituales y poco habituales:

- Aumento de los niveles en sangre de una enzima llamada lipasa.
- Inflamación de la nariz o la garganta.
- Tos.
- Estreñimiento.

Linagliptina puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas linagliptina, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

