



Mepifilina



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve la mepifilina?

La mepifilina es un medicamento que sirve para tratar la bronquitis.

La bronquitis es una enfermedad en la que se inflaman los conductos de las vías respiratorias

que llevan el aire hasta los pulmones. y se llaman bronquios.

La bronquitis puede durar poco tiempo o mucho y por eso se le llama aguda o crónica.



Avisos importantes

- No puedes tomar bebidas con alcohol mientras estás tomando mepifilina.
- No es recomendable que lo tomen bebés recién nacidos o nacidos antes de tiempo porque puede causar problemas en su sistema nervioso, por ejemplo, convulsiones.



Salud más fácil

- Para pacientes mayores que toman otros medicamentos para alergias puede producir mareos, confusión, sueño o tensión alta.
- Avisa al médico si estás embarazada, crees que puedes estar embarazada o estás dando el pecho.
- Ten precaución para conducir o utilizar maquinas.
- Cuando te realicen algunas pruebas de alergia en la piel el medicamento puede hacer que cambien los resultados.
Por esto es mejor dejar de tomarlo 72 horas antes de la prueba.



¿Puedo tomar mepifilina?

Nunca tomes mepifilina

- Cuando tienes alergia a la mepifilina o a algún componente de este medicamento.
- Cuando tienes problemas del hígado.
- Cuando tienes bloqueado el cuello de la vejiga.
- Cuando tienes problemas de próstata.
- Cuando tienes retención de orina.
- Cuando tienes glaucoma
que es una enfermedad del ojo en el que el nervio está dañado.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar mepifilina

- Para tratar el sistema nervioso central.
- Para tratar la depresión.
- Para tratar algún tipo de alergia o intolerancia.



¿Cuánta mepifilina puedo tomar?

Cada gota tiene 1 miligramo de mepifilina.

La dosis depende del peso del niño que vaya a tomarlo.

El médico te indicará la dosis adecuada.

En bebés recién nacidos que toman pecho,
lo habitual es tomar 3 gotas por cada kilo de peso del niño
pero repartidas y divididas en 4 veces al día.

En niños, lo habitual es tomar 8 gotas por cada kilo de peso del niño
divididas en 4 veces al día.



¿Cómo debo tomar mepifilina?

Mepifilina puede tomarse en gotas.

Debes tragarlas.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar mepifilina?

Toma la dosis tan pronto como te acuerdes.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más mepifilina de la debida?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas mepifilina y cuánto has tomado.



Efectos adversos de mepifilina

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

La mepifilina tiene un efecto adverso muy habitual que es que produce más sueño.

Mepifilina puede tener también otros efectos adversos habituales como:

- Visión borrosa.
- Confusión.
- Dificultad para orinar.
- Mareos.
- Boca seca.
- Ritmo más rápido del corazón.
- Zumbido en los oídos.
- Lesiones de piel.
- Molestias o dolor en el abdomen.



Salud más fácil

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas mepifilina avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

