



Silodosina



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve la silodosina?

La silodosina es un medicamento que sirve para relajar los músculos de la vejiga, la uretra y la próstata en hombres en los que la próstata se ha agrandado, para que resulte más fácil orinar.

Alivia los síntomas como:

- Problemas para orinar.
- Sensación de no vaciar por completo la vejiga.
- Necesidad de orinar a menudo, incluso por la noche.



Avisos importantes

- Es importante que informes a tu médico si estás tomando otros medicamentos para que él valore si puedes tomar silodosina
- No deben tomarlo niños, niñas o adolescentes menores de 18 años.
- Tomar silodosina puede afectar en la fertilidad al reducir el semen producido en las relaciones sexuales. La fertilidad es la capacidad para poder tener hijos. Este efecto desaparece cuando dejas de tomarlo pero puedes consultar a tu médico si quieres tener hijos.
- Cuando sientas mareos u otros síntomas no conduzcas ni utilices máquinas.



¿Puedo tomar silodosina?

Nunca tomes silodosina

- Cuando tienes alergia a la silodosina o a algún componente de este medicamento.
 - Tienes problemas de hígado graves.
 - Tienes problemas de riñón graves.
 - No sirve para tratar el cáncer de próstata.
- El médico podrá realizar pruebas para descartar que tienes cáncer.



Salud más fácil

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar silodosina

- Vas a operarte de cataratas en los ojos
porque suele tener complicaciones en los músculos del iris
que es la parte de color del ojo.
El médico oftalmólogo tendrá esto en cuenta
para tener más cuidado en la operación
o para suspender el tratamiento con silodosina un tiempo.
- Si te mareas o desmayas al ponerte de pie rápido.
Este medicamento baja la tensión
y puede producir mareos si se toma con otros medicamentos.
- Tienes problemas de riñón.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar silodosina

- Para tratar los problemas de tensión.
- Para tratar infecciones como el SIDA.
- Para evitar el rechazo de un trasplante.
- Para tratar problemas de erección o impotencia.
- Para tratar la epilepsia o la tuberculosis.



¿Cuánta silodosina puedo tomar?

Lo habitual es tomar 1 cápsula de 8 miligramos
1 vez al día a la misma hora.

Cuando tengas problemas de riñón el medico podrá recetarte
4 miligramos 1 vez al día en cápsulas duras.

Tu médico también puede mandarte una dosis de menos cantidad
cuando estás tomando otros medicamentos
para evitar problemas de riñón.



¿Cómo debo tomar silodosina?

Puedes tomar silodosina en cápsulas.

Hay que tragarlas enteras con un poco de agua
y junto con alimentos.

No debes masticar la cápsula ni romperla.

¿Cómo debo dejar de tomar silodosina?

Si dejas de tomar silodosina

Pueden volver a aparecer los síntomas.



Deja de tomar silodosina de forma inmediata

Deja de tomar silodosina

y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Cara o garganta hinchada.
- Problemas para respirar.
- Sensación de desmayo.
- Picor en la piel.
- Urticaria.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar silodosina?

Toma la dosis tan pronto como te acuerdes.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más silodosina de la debida?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas silodosina y cuánto has tomado.



Efectos adversos de silodosina

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Los efectos adversos muy habituales y habituales de la silodosina pueden ser:

- Eyaculación diferente con una cantidad de semen menor en las relaciones sexuales.
- Mareos.
- Mocos u obstrucción de la nariz.
- Diarrea.

Silodosina puede tener también otros efectos adversos raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas silodosina

avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

