



Amantadina hidrocloreuro



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve la amantadina hidrocloreuro?

La amantadina hidrocloreuro es un medicamento dopaminérgico. Los dopaminérgicos son un tipo de medicamentos que hacen que el cerebro funcione mejor.

Este medicamento sirve para tratar las infecciones que causa el virus de la gripe A.

Sirve para prevenir y tratar los síntomas de este virus pero no sustituye a la vacuna de la gripe.

También se utiliza para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson como:

- temblores,
- rigidez, es decir, cuando los músculos se contraen y paralizan.
- o las dificultades de movimiento.



La enfermedad de Párkinson es una enfermedad que afecta al movimiento del cuerpo.

Ocurre cuando las neuronas del cerebro no producen suficiente cantidad de una sustancia que se llama dopamina, que es importante para que el cerebro funcione bien.

La dopamina es una sustancia que produce adrenalina.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes amantadina hidrocloreto.
- Los niños menores de 10 años. no pueden tomar este medicamento.
- Avisa al médico si estás embarazada, crees que puedes estar embarazada o estás dando el pecho.



¿Puedo tomar amantadina hidrocloreto?

Nunca tomes amantadina hidrocloreto

- Cuando tienes alergia a la amantadina, a la rimantadina o algún componente de este medicamento.
- Cuando tienes enfermedades del corazón, como arritmias, es decir, enfermedades relacionadas con el ritmo cardíaco.
- Cuando estás tomando budipina o medicamentos que alteran las pruebas del ritmo cardíaco.
- Cuando estás embarazada o das el pecho.
- Cuando tienes convulsiones.



Salud más fácil

- Cuando has tenido sangrados de estómago.
- Cuando orinas poco y tienes problema en los riñones.
- Cuando tengas presión alta en los ojos.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar amantadina hidrocloreuro

- Tienes problemas de próstata.
- Tienes problemas de riñones o hígado.
- Te encuentras nervioso o tienes alucinaciones.
- Tienes epilepsia o trastorno psiquiátrico.
- Estás tomando memantina como tratamiento para el Alzheimer.
- Tienes problemas de corazón.
- Tienes síndrome orgánico cerebral o sueles tener mareos.
El síndrome orgánico cerebral es una enfermedad que afecta a las funciones del cerebro.
- Tienes problemas de tensión arterial o acumulación de líquido en las piernas.
- Tienes eczemas o lesiones en la piel.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar amantadina hidrocloreuro.

- Para tratar o prevenir alteraciones en el ritmo cardiaco.
- Tranquilizantes o antipsicóticos.
- Medicamentos para tratar la depresión.
- Medicamentos para la alergia.
- Algún tipo de antibióticos.
- Medicamentos para tratar hongos.
- Otros medicamentos para tratar la malaria, algunas infecciones, el reflujo del estómago o la angina de pecho.



Salud más fácil

- Algunos medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias, enfermedad de Parkinson o enfermedades en los ojos.
- Medicamentos para tratar funciones mentales y del pensamiento, por ejemplo, la memoria o la atención.
- Medicamentos para eliminar la orina.
- Antibióticos

Cuando tomas otros medicamentos para tratar el Parkinson es necesario que tu médico baje la dosis para poder tomar los dos medicamentos.



¿Cuánta amantadina hidrocloreuro puedo tomar?

Tu médico te indicará cuánta amantadina hidrocloreuro debes tomar y cuánto tiempo durará el tratamiento.

Recuerda que debes tomarla a diario sin interrumpir el tratamiento hasta que tu médico te lo indique.

El médico te indicará la duración del tratamiento y modificará la dosis para ajustarla a lo que necesitas.

- Para tratar la gripe y para prevenirla:
1 cápsula de 100 miligramos 2 veces al día.

- Para prevenir la gripe:
1 cápsula de 100 miligramos 2 veces al día
durante 6 semanas o menos.

Cuando tomas amantadina hidrocloreuro y te has puesto la vacuna el tratamiento dura entre 2 y 4 semanas.



Salud más fácil

- Para tratar el Párkinson:
Empieza el tratamiento tomando 1 cápsula de 100 miligramos
1 vez al día
durante 1 semana.
Después de esa semana 1 cápsula de 100 miligramos
2 veces al día.
No puedes tomar más de 4 cápsulas al día.
- En pacientes con enfermedades en el riñón
el médico ajustará la dosis.
También te hará pruebas y análisis para comprobar
cómo están funcionando los riñones.
- En pacientes de mucha edad empezarán tomando
una dosis muy baja porque les afecta más.



¿Cómo debo tomar amantadina hidrocloreuro?

Amantadina hidrocloreuro puede tomarse como comprimidos.
Hay que tragarlos enteros con un poco de agua.

La amantadina hidrocloreuro produce insomnio, es decir,
puedes sentir dificultad para dormir.
Por eso, es mejor no tomarla a última hora de la tarde o por la noche.



Deja de tomar amantadina hidrocloreuro de forma inmediata

Deja de tomar amantadina hidrocloreuro
y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Si sientes impulsos o deseos que no puedes controlar, por ejemplo, a apostar, gastar mucho dinero o agredir a alguien o a ti mismo.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar amantadina hidrocloreuro?

Toma la dosis tan pronto como te acuerdes.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más amantadina hidrocloreuro de la debida?

Cuando tienes una sobredosis,
quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Los síntomas de una sobredosis de este medicamento son por ejemplo náuseas, vómitos, temblores o problemas para hablar.

Para eliminar el medicamento de tu cuerpo será necesario provocar el vómito o eliminarlo por la orina.



Salud más fácil

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas amantadina y cuánto has tomado.



Efectos adversos de amantadina hidrocloreuro

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Amantadina puede tener los siguientes efectos adversos muy habituales:

- Piernas hinchadas.
- Manchas de color azul o rojo en la piel.

Amantadina puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Mucho sueño o falta de sueño.
- Depresión.
- Nerviosismo.
- Vértigo que es la sensación de pérdida de equilibrio y mareo.
- Dolor de cabeza.
- Alucinaciones.
- Confusión.
- Sueño continuado y profundo.
- Pesadillas.
- Movimientos que no controlamos.
- Dificultad para hablar.
- Bajada de tensión.
- Latidos del corazón fuertes y rápidos.
- Boca seca.
- Ganas de vomitar.
- Pérdida de las ganas de comer.
- Vómitos.



- Estreñimiento.
- Aumento del sudor.
- Dolor de músculos.

Amantadina hidrocloreuro puede tener otros efectos adversos raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo

mientras tomas amantadina

avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento,

avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.
El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.
Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

