



## Cefixima



### RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

---

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



### ¿Para qué sirve cefixima?

---

La Cefixima es un antibiótico

que utilizamos para tratar infecciones causadas por:

- Irritación fuerte de los bronquios.  
Los bronquios son 2 conductos en forma de tubo que unen la tráquea con nuestros pulmones y permiten que el aire llegue a ellos.
- Inflamación fuerte del oído.
- Sinusitis, que es una inflamación de la zona que tenemos entre la nariz y el cráneo encargada de generar mocos.
- Cistitis, que es una infección de vejiga.
- Infección de los órganos encargados de producir y mover la orina a otras zonas para que la eliminen, por ejemplo, los riñones.



- Gonorrea, es decir, una infección que afecta a los genitales y se extiende por la boca y el ano también.



## Avisos importantes

---

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes cefixima.
- Este medicamento no lo deben tomar menores de edad que tienen problemas de riñón.
- Tampoco lo deben tomar menores de 12 años.
- Tu médico debe vigilar cómo funcionan tus riñones cuando tomas cefixima con otros antibióticos.
- Tomar este medicamento durante mucho tiempo puede provocar problemas en el intestino grueso.
- Avisa a tu médico si durante el tratamiento o después tienes diarrea durante mucho tiempo.
- Este medicamento hace que los anticonceptivos orales, que toman las mujeres para no quedarse embarazadas, sean menos efectivos.

Esto quiere decir que no funcionan igual y que es más probable que puedas quedarte embarazada.

- Este medicamento provoca que des un falso positivo en algunos análisis de sangre y en pruebas que hacemos a través de la orina.

Un falso positivo es un error en una prueba médica, por ejemplo, dar positivo a una enfermedad y que no sea verdad.



## ¿Puedo tomar cefixima?

---

### **Nunca tomes cefixima**

- Si tienes alergia a la cefixima o a alguna de las sustancias que componen este medicamento.
- Si tienes alergia a la penicilina o a cualquier antibiótico.

### **Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar cefixima**

- Te dan reacción o alergia otros medicamentos.
- Problemas de riñón.
- Problemas de hígado.

### **Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar cefixima**

- Medicamentos que pueden dañar el riñón y que usamos para tratar enfermedades graves como:
  - Infecciones.
  - Cáncer.
  - Tensión alta.
  - Dolor constante.
- Para eliminar agua y sodio a través de la orina.
- Para tratar la tensión alta de las arterias.
- Para tratar el dolor fuerte del pecho.
- Contra la coagulación de la sangre, es decir, medicamentos que mantienen la sangre líquida.



## ¿Cuánto cefixima puedo tomar?

---

Lo habitual es tomar 1 comprimido de 400 miligramos al día o 2 comprimidos de 200 miligramos de una sola vez.



## ¿Cómo debo tomar cefixima?

---

Cefixima es un medicamento en cápsulas o comprimidos que debes tomar con un vaso de agua.

Trágate la cápsula o el comprimido entero y no la mastiques ni las abras o rompas.

Puedes tomarlo con o sin alimentos.

Lo habitual es tomar cefixima durante 7 días.

Si la infección es grave tu médico puede pedirte que la tomes durante 14 días.

En el caso de que seas mujer y tengas cistitis o infección de vejiga el tratamiento será de 1 a 3 días.

## ¿Cómo debo dejar de tomar cefixima?

No debes dejar de tomar cefixima sin avisar antes al médico.



## Deja de tomar cefixima de forma inmediata

---

Deja de tomar cefixima y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Reacción alérgica grave que aparece de forma rápida.
- Diarrea durante muchos días.



## ¿Qué hago si me he olvidado de tomar cefixima?

---

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

**Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.**

Cuando olvidas tomar cefixima durante más de un día, debes avisar al médico de forma inmediata.



## ¿Qué hago si he tomado más cefixima de la debida?

---

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas cefixima y cuánta has tomado.



## Efectos adversos de cefixima

---

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento, porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Cefixima puede tener los siguientes efectos adversos:

### **Muy habituales:**

- Diarrea

### **Habituales:**

- Dolor de cabeza.
- Dolor de estómago y ganas de vomitar.
- Vómitos.
- Irritación o ampollas en la piel.
- Inflamación en las células del hígado.

Cefixima puede tener otros efectos adversos raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas cefixima, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



## TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



### Advertencias para algunos pacientes

---

#### **Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna**

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

#### **Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas**

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

#### **Personas que tienen alergias alimentarias**

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



### Advertencias para conservar medicamentos

---

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Conserva este medicamento en un sitio fresco

y dentro de su caja para protegerlo de la luz y la humedad.



## Salud más fácil

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.

La fecha de caducidad suele aparecer con el número del mes y el año junto a las letras CAD o EXP. La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.

---

Un proyecto de



Con la colaboración de

**S A N D O Z**

Con el aval de

