



Cefuroxima



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve cefuroxima?

La cefuroxima es un antibiótico que utilizamos para tratar infecciones causadas por bacterias.

Este medicamento sirve para tratar infecciones de:

- Garganta.
- Senos de la nariz, que es la zona entre la nariz y el cráneo encargada de generar mocos.
- Oído.
- Pulmones o pecho.
- Órganos encargados de eliminar la orina, cómo, los riñones, la vejiga o la uretra.
- Piel y tejido que está debajo de la piel.

La cefuroxima también sirve para tratar la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad transmitida por garrapatas.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes cefuroxima.
- Este medicamento es un antibiótico.
Los antibióticos sirven para tratar infecciones causadas por bacterias, nunca son utilizados para tratar infecciones causadas por virus, como la gripe o el catarro.
- Los menores de 3 meses no pueden tomar este medicamento.
- Si vas a hacerte un análisis
avisa al personal sanitario que estas tomando cefuroxima.
Este medicamento puede cambiar los resultados de tu análisis de sangre o de orina.
- Avisa a tu médico de los medicamentos con receta o sin receta que estas tomando, o que has tomado hace poco.
También avisa si tienes que tomar otros medicamentos en el futuro.
- Tomar más cefuroxima de la que te mande tu médico puede provocar convulsiones o ataques.
- Debes realizar el tratamiento completo, no dejes de tomar cefuroxima aunque te encuentres mejor.
Solo puedes dejar el tratamiento si tu médico te lo dice.



¿Puedo tomar cefuroxima?

Nunca tomes cefuroxima

- Cuando tienes alergia a cefuroxima o a alguna de las sustancias que componen este medicamento.
- Cuando tienes alergia a antibióticos que sirven para tratar infecciones por bacterias.
- Cuando has tenido problemas en la piel o heridas en la boca al tomar algún antibiótico.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar cefuroxima

- Problemas de riñón.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar cefuroxima

- Para reducir la cantidad de ácido en el estómago.
- Para reducir la cantidad de ácido úrico.
El exceso de ácido úrico provoca enfermedades, por ejemplo, la gota.
- Contra la coagulación de la sangre,
es decir, medicamentos que mantienen la sangre líquida.



¿Cuánta cefuroxima puedo tomar?

Lo habitual es tomar 2 comprimidos al día.

Adultos y niños que pesan 40 kilos o más

Lo habitual es tomar 1 o 2 comprimidos 2 veces al día.

Los comprimidos pueden ser de 250 o de 500 miligramos, en función del tipo de infección y de lo grave que sea.

Niños que pesan menos de 40 kilos

Lo habitual es tomar este medicamento 2 veces al día.

La cantidad recomendada es de 10 o 15 miligramos por cada kilo que pesa el niño.

Nunca deben tomar más de 250 miligramos por cada toma.

Personas con problemas de riñón

Tu médico puede cambiarte la cantidad que debes tomar.



¿Cómo debo tomar cefuroxima?

Cefuroxima es un medicamento en comprimidos que debes tomar con un vaso de agua.

Trágate el comprimido entero y no la mastiques ni rompas.

Debes tomarlo después de haber comido.

¿Cómo debo dejar de tomar cefuroxima?

No debes dejar de tomar cefuroxima sin avisar antes al médico.



Deja de tomar cefuroxima de forma inmediata

Deja de tomar cefuroxima y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Rojeces en la piel en forma de círculo.
- Ampollas en la piel.
- Fiebre y ampollas abultadas.
- Heridas en:
 - Boca.
 - Garganta.
 - Nariz.
 - Genitales.
 - Y ojos.

Puede que tengas fiebre y síntomas parecidos a la gripe antes de que salgan estas heridas y problemas en la piel.

- Cara o boca hinchadas que causan problemas para respirar.
- Fiebre y ganglios hinchados, los ganglios están por todo el cuerpo y ayudan a reconocer y combatir microbios, infecciones y otras sustancias extrañas.
- Dolor en el pecho.
- Infecciones por hongos.
- Diarrea grave.
- Fiebre, escalofríos y dolores de cabeza o musculares.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar cefuroxima?

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma al día siguiente a la hora de siempre.

**Nunca tomes el doble de cantidad
para compensar la toma olvidada.**

Cuando olvidas tomar cefuroxima durante más de un día,
debes avisar al médico de forma inmediata.



¿Qué hago si he tomado más cefuroxima del debido?

Cuando tienes una sobredosis,
quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas cefuroxima y cuánta has tomado.



Efectos adversos de cefuroxima

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento, porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Cefuroxima puede tener los siguientes efectos adversos:

Muy habituales:

- Infección por hongos.
- Dolor de cabeza.
- Mareos.
- Diarrea.
- Sensación de malestar.
- Dolor de estómago.

Habituales:

- Ganas de vomitar.
- Sarpullido o ampollas en la piel.

Cefuroxima puede tener otros efectos adversos raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas cefuroxima, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Conserva este medicamento en un sitio fresco

y dentro de su caja para protegerlo de la luz y la humedad.



Salud más fácil

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.

La fecha de caducidad suele aparecer con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

