



Desmopresina



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve desmopresina?

La desmopresina es un medicamento que reduce la cantidad de orina producida por los riñones.

Este medicamento sirve para tratar:

- La diabetes insípida, que es una enfermedad de larga duración, que produce mucha cantidad de orina y provoca mucha sed.
- La falta de control de la vejiga por la noche, que hace que se nos escape la orina sin darnos cuenta.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes desmopresina.
- Este medicamento sirve para tratar la diabetes insípida, no confundir con otro tipo de diabetes.
- Antes de comenzar a tomar este medicamento tu médico debe decirte que cantidad de líquido puedes beber.
- Si tomas este medicamento para tratar problemas de control de vejiga, debes beber lo menos posible 1 hora antes de tomar este medicamento y durante las 8 horas después de tomarlo.
- Beber demasiado líquido puede provocar que nuestro cuerpo lo acumule dentro y no lo expulse.



¿Puedo tomar desmopresina?

Nunca tomes desmopresina

- Cuando tienes alergia a la desmopresina o a alguna de las sustancias que componen este medicamento.
- Cuando bebes demasiado líquido.
- Cuando tienes problemas de corazón.
- Cuando estas tomando medicamentos que aumentan la cantidad de orina.
- Cuando tienes problemas de riñón.
- Cuando tienes poco sodio en la sangre.
- Cuando produces gran cantidad de la hormona que controla el agua que absorben los riñones. Mucha cantidad de esta hormona provoca que retengas agua y que disminuya sodio en la sangre.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar desmopresina

- Infección, fiebre o malestar en el estómago.
- Problemas de vejiga.
La vejiga es el órgano que recoge y almacena la orina que producen los riñones.
- Produces poca cantidad de orina.
- Eres una persona mayor.
- Asma.
- Epilepsia.
- Dolores de cabeza fuertes y continuos.



Salud más fácil

- Fibrosis quística, que es una enfermedad que afecta a los pulmones y al sistema digestivo. El sistema digestivo son los órganos encargado de transformar los alimentos en nutrientes y eliminar lo que sobra.
- Sufres peligro de que aumente la presión dentro de tu cráneo.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar desmopresina

- Antidepresivos.
- Medicamentos contra la epilepsia.
- Para tratar problemas de salud mental.
- Contra la diarrea.
- Para tratar el dolor.
- Para tratar la inflamación.
- Para tratar los gases del estómago.



¿Cuánta desmopresina puedo tomar?

Tu médico te dirá la cantidad que debes tomar.

Para tratar la diabetes insípida

Adultos y niños

Lo habitual es tomar 60 microgramos

3 veces al día.

Tu médico puede subirte la cantidad que debes tomar.



Para tratar los problemas de control de vejiga

Adultos y niños mayores de 5 años

Lo habitual es tomar 120 microgramos al acostarse y después de haber orinado.

Tu médico puede subirte la cantidad a 240 microgramos.

Tu médico debe comprobar cada 3 meses si necesitas continuar con el tratamiento.

Personas mayores

Antes y durante el tratamiento debe controlarse la cantidad de sodio en la sangre.

Las personas mayores no deben comenzar el tratamiento si los niveles de sodio en sangre están mal.



¿Cómo debo tomar desmopresina?

Desmopresina se toma en comprimidos que se colocan debajo de la lengua para que se deshagan.

Este medicamento se toma sin agua.

¿Cómo debo dejar de tomar desmopresina?

No debes dejar de tomar desmopresina sin avisar antes al médico.



Deja de tomar desmopresina de forma inmediata

Deja de tomar desmopresina y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Dolor de cabeza.
- Náuseas o vómitos.
- Dolor de estómago.
- Aumento de peso.
- Convulsiones.
- Desmayos.
- Reacción alérgica, como:
 - Problemas en la piel.
 - Picor.
 - Fiebre.
 - Hinchazón en la boca, lengua o vías respiratorias, que provocan problemas para respirar.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar desmopresina?

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma al día siguiente a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.

Cuando olvidas tomar desmopresina durante más de un día, debes avisar al médico de forma inmediata.



¿Qué hago si he tomado más desmopresina del debido?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas desmopresina y cuánto has tomado.

Una sobredosis de este medicamento puede provocar que el cuerpo acumule líquidos y esto cause convulsiones y desmayos.



Efectos adversos de desmopresina

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento, porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Desmopresina puede tener los siguientes efectos adversos:

Muy habituales:

- Dolor de cabeza.
- Poca cantidad de sodio en la sangre.
- Mareos.
- Presión alta en las arterias.
- Náuseas y vómitos.
- Diarrea.
- Estreñimiento.



- Problemas para orinar.
- Hinchazón de manos, brazos o piernas.

Habituales:

- Dificultades para dormir.
- Sensación de quedarte dormido.
- Torpeza.
- Cambios en la vista.
- Aumento del latido del corazón.
- Baja presión en las arterias.
- Sensación de que te falta el aire.
- Malestar en el estómago.
- Sudor.
- Picor.
- Sarpullido o ampollas en la piel.
- Temblores musculares.
- Dolor muscular.
- Ganas de orinar urgentes.
- Malestar.
- Dolor en el pecho.
- Sensación parecida a la gripe.
- Aumento de peso.
- Problemas de hígado.
- Bajo nivel de potasio en la sangre.

Desmopresina puede tener otros efectos adversos raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas desmopresina, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento,
avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Conserva este medicamento en un sitio fresco

y dentro de su caja para protegerlo de la luz y la humedad.



Salud más fácil

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.

La fecha de caducidad suele aparecer con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

