



Macrogol



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve macrogol?

Macrogol es un medicamento que sirve para tratar los problemas de estreñimiento.

El estreñimiento provoca que no expulsemos bien nuestras heces.

Este medicamento aumenta la cantidad de agua en las heces, lo que provoca que el intestino funcione más rápido y expulsemos mejor nuestras heces.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes macrogol.
- Este medicamento es solo para adultos y niños mayores de 12 años.



Salud más fácil

- Los menores de 18 años pueden tomar este medicamento solo durante 3 meses.
- Debes mantener una dieta y un estilo de vida saludable mientras tomas este medicamento.
- En personas mayores este medicamento puede provocar que bajen los niveles de potasio o sodio en sangre.
- Nunca mezcles este medicamento con productos que espesan los alimentos. Los productos que espesan los alimentos sirven para personas que tienen problemas para tragar.
- Avisa a tu médico si crees que estás embarazada o si piensas quedarte embarazada. También, en caso de que estés dando el pecho a tu hijo o hija.



¿Puedo tomar macrogol?

Nunca tomes macrogol

- Cuando tienes alergia al macrogol o a alguno de sus componentes.
- Cuando tienes problemas graves de intestino.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar macrogol

- Problemas de hígado.
- Problemas de riñón.
- Problemas para tragar.



Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar macrogol

- Para eliminar los líquidos que le sobran al cuerpo.
- Para tratar problemas del corazón.
- Contra la epilepsia.
- Que contengan un componente llamado cumarina, este componente ayuda a:
 - Mantener la sangre líquida.
 - Evitar inflamaciones.
 - Hacer más anchos las venas o arterias.



¿Cuánto macrogol puedo tomar?

Tu médico te dirá que cantidad debes tomar al día, lo habitual es tomar 1, 2 o 3 sobres al día.

Este medicamento hace efecto después de 1 o 2 días de haberlo tomado.

Si necesitas tomar este medicamento durante más de 2 semanas, consulta con tu médico.



¿Cómo debo tomar macrogol?

Macrogol debe tomarse con un vaso de agua.

Echa el contenido del sobre en un vaso de agua y mézclalo.

También existe en sobres listos para tomar sin agua.



¿Cómo debo dejar de tomar macrogol?

No debes dejar de tomar macrogol sin avisar antes al médico.



Deja de tomar macrogol de forma inmediata

Deja de tomar macrogol

y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Reacción alérgica, en la que sientes la cara o la garganta hinchada.
- Picor o enrojecimiento de la piel.
- Desmayo.
- Problemas para respirar.
- Sensación de malestar.
- Dolor de estómago.
- Sangras por el ano.
- Diarrea.
- Vómitos.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar macrogol?

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma al día siguiente a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más macrogol del debido?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas macrogol y cuánto has tomado.

Cuando tomas más macrogol del que debes puedes tener los siguientes problemas:

- Diarrea.
- Dolor de estómago.
- Vómitos.



Efectos adversos de macrogol

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Macrogol puede tener los siguientes efectos adversos:

En niños

Muy habituales:

- Dolor de estómago.
- Diarrea.
- Dolor alrededor del ano.



Habituales

- Vómitos o ganas de vomitar.
- Estomago hinchado.

Adultos

Muy habituales:

- Dolor de estómago.
- Estomago hinchado.
- Ganas de vomitar.
- Diarrea.

Habituales

- Vómitos.
- Te entran ganas de hacer caca de repente.
- No controlas los momentos de hacer caca.

Macrofol puede tener también otros efectos adversos poco habituales, raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas macrofol
avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento,
avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

