



Micofenolato de mofetilo



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve micofenolato de mofetilo?

Micofenolato de mofetilo es un medicamento inmunosupresor. Un medicamento inmunosupresor sirve para reducir la actividad de tu sistema inmunológico. Tu sistema inmunológico sirve para protegerte. Por ejemplo, cuando te resfrías, tu sistema inmunológico trabaja para eliminar el virus y te ayuda a recuperarte.

Micofenolato de mofetilo sirve para que tu cuerpo acepte bien un trasplante de:

- Hígado.
- Riñón.
- Corazón.

Un trasplante es cuando te cambian un órgano que está dañado por uno nuevo que funciona bien.



Avisos importantes

- Consulta a tu médico antes de tomar micofenolato de mofetilo.
- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes micofenolato de mofetilo.
- No tomes el sol cuando tomes micofenolato de mofetilo.
- No tomes micofenolato de mofetilo si estás embarazada o quieres quedarte embarazada dentro de poco.
- Debes hacerte una prueba de embarazo antes de tomar este medicamento.
- Avisa a tu médico si te quedas embarazada.
- No puedes donar semen si tomas micofenolato de mofetilo.
- Debes utilizar métodos anticonceptivos cuando tomas micofenolato de mofetilo.
Pero cuando dejes de tomar este medicamento también debes tomar anticonceptivos durante 6 meses si eres mujer o durante 3 meses si eres hombre.
- No puedes dar el pecho si tomas micofenolato de mofetilo.
- Las vacunas pueden ser menos efectivas cuando tomas micofenolato de mofetilo.
- Este medicamento no está recomendado para niños con menos de 2 años.



¿Puedo tomar micofenolato de mofetilo?

Nunca tomes micofenolato de mofetilo

- Cuando tienes alergia al micofenolato de mofetilo o a algún componente de este medicamento.
- Cuando has tenido alguna reacción alérgica a algún otro tipo de medicamento inmunosupresor.
- Cuando tengas pensado quedarte embarazada. El feto puede sufrir problemas.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar micofenolato de mofetilo

- Enfermedades del aparato digestivo.
- Enfermedades del riñón.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar micofenolato de mofetilo.

- Con cualquier otro medicamento con o sin receta.
- Cuando te vayas a poner alguna vacuna.



¿Cuánto micofenolato de mofetilo puedo tomar?

La cantidad de micofenolato de mofetilo que puedes tomar depende del trasplante que te han hecho.

- Con trasplante de riñón:
Debes tomar micofenolato de mofetilo en los 3 primeros días después de la operación.



En el caso de adultos la dosis máxima recomendada es de 4 comprimidos en 2 tomas separadas, es decir, 2 comprimidos de 500 miligramos por la mañana y 2 comprimidos de 500 miligramos por la noche.

En el caso de niños de 2 a 18 años la dosis depende del peso del niño. El médico decidirá cuál es la dosis más adecuada y tendrá en cuenta la estatura y el peso del niño.

- Con trasplante de corazón:
Debes tomar micofenolato de mofetilo en los 5 primeros días después de la operación.

En el caso de adultos la dosis máxima recomendada es de 6 comprimidos en 2 tomas, es decir, 3 comprimidos de 500 miligramos por la mañana y 3 comprimidos de 500 miligramos por la noche.

En el caso de niños con trasplante de corazón, no existe información sobre el uso de micofenolato de mofetilo.

- Con trasplante de hígado:
Debes tomar micofenolato de mofetilo en los 4 primeros días desde la operación y cuando seas capaz de tragar la medicación oral. Los primeros días te darán el medicamento en vena y después en pastillas.

En el caso de adultos, la dosis máxima recomendada es de 6 comprimidos en 2 tomas, es decir 3 comprimidos de 500 miligramos por la mañana y 3 comprimidos de 500 miligramos por la noche.



Las dosis máximas recomendadas pueden cambiar en estos casos, cuando tienes:

- Más de 65 años.
- Una insuficiencia renal crónica grave, esto quiere decir que tu riñón funciona mal.

Sigue las instrucciones que te dé tu médico y tomate las dosis que te manden.



¿Cómo debo tomar micofenolato de mofetilo?

Sigue estas instrucciones para tomar Micofenolato de mofetilo:

- Toma micofenolato de mofetilo sin comida.
- Toma micofenolato de mofetilo con un poco de agua.
- No mastiques ni aplastes el comprimido.

¿Cómo debes dejar de tomar Micofenolato de mofetilo?

No dejes de tomar Micofenolato de mofetilo de forma inmediata.

Consulta con tu médico si quieres dejar el tratamiento.

Para dejar de tomar este medicamento es importante el control médico porque tu cuerpo puede rechazar el nuevo órgano.



Deja de tomar micofenolato de mofetilo de forma inmediata

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas micofenolato de mofetilo, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar micofenolato de mofetilo?

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.
Espérate y toma la siguiente dosis.



¿Qué hago si he tomado más micofenolato de mofetilo del debido?

Cuando tienes una sobredosis,
quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas micofenolato de mofetilo y cuánto has tomado.



Efectos adversos de micofenolato de mofetilo

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o te sienta mal.

Consulta con tu médico

si notas alguno de los siguientes efectos adversos graves ya que podrías necesitar tratamiento médico urgente:

- Síntomas de infección como fiebre o dolor de garganta,
- Si aparecen cardenales o una hemorragia inesperada,
- Si tienes síntomas de una reacción alérgica grave con síntomas como:
 - erupción, picor, ronchas,
 - dificultad para respirar o respiración dificultosa,
 - pitos en el pecho o tos,
 - aturdimiento o mareos
 - cambios en el nivel de conciencia, es decir, cuando la persona se siente confundido o no responde,
 - tensión baja o enrojecimiento de la piel
 - hinchazón de la cara o garganta.

Micofenolato de mofetilo puede tener los siguientes efectos adversos frecuentes:

- Infecciones.
- Problemas en la sangre, como anemia, que es la falta de hierro en la sangre.
- Alteraciones metabólicas, como hiperglucemia, que es cuando hay mucho azúcar en la sangre.
- Problemas de salud mental.



- Dolor de cabeza.
- Temblores.
- Problemas con la tensión.
- Tos.
- Dificultad para respirar.
- Problemas con el estómago.
- Problemas con el hígado y el riñón.
- Dolor de cuello y espalda.
- Fiebre.
- Cansancio.

Micofenolato de mofetilo puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas micofenolato de mofetilo, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD o EXP.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

