



Naproxeno - Esomeprazol



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve Naproxeno - esomeprazol

Naproxeno - Esomeprazol es la combinación de 2 medicamentos que actúan de forma diferente:

- El naproxeno sirve para tratar las inflamaciones y reduce el dolor y la inflamación.
- El esomeprazol sirve para reducir la cantidad de ácido en el estómago. Además, ayuda a reducir el riesgo de úlceras o heridas en el estómago y también ayuda a prevenir otros problemas que aparecen en pacientes que toman antiinflamatorios para aliviar el dolor.

Naproxeno - esomeprazol sirve para aliviar el dolor, la hinchazón y la inflamación de:

- Artrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa que implica el desgaste de las articulaciones.



- Artritis reumatoide.

La artritis reumatoide es una enfermedad que afecta al sistema de defensas del cuerpo.

- Espondilitis anquilosante.

La espondilitis anquilosante es una enfermedad que inflama la columna vertebral y la pelvis.



Avisos importantes

- Consulta a tu médico si tienes una erupción en la piel mientras tomas naproxeno - esomeprazol.
- Los niños y adolescentes no deben tomar naproxeno - esomeprazol.
- No tomes naproxeno - esomeprazol cuando estás en los últimos 3 meses del embarazo o cuando estás dando de mamar a tu hijo.
- Naproxeno - esomeprazol puede provocar que tengas más dificultades para quedarte embarazada.
- Naproxeno - esomeprazol puede provocar mareo y visión borrosa. Tenlo en cuenta si a conducir o utilizar máquinas.
- Naproxeno - esomeprazol tiene lactosa, consulta a tu médico si tienes intolerancia.



¿Puedo tomar naproxeno - esomeprazol?

Nunca tomes naproxeno - esomeprazol

- Cuando tienes alergia al naproxeno o al esomeprazol o a algún componente de estos medicamentos.
- Cuando tomas medicamentos como atazanavir o nelfinavir para tratar la infección del virus VIH.
- Cuando los medicamentos como el ácido acetilsalicílico, el naproxeno u otros medicamentos para tratar la inflamación te han producido asma o una reacción alérgica con picor en la piel.
- Cuando estás en los últimos 3 meses de tu embarazo.
- Cuando tienes problemas de hígado.
- Cuando tienes problemas de riñón.
- Cuando tienes problemas en el corazón.
- Cuando tienes problemas en el estómago o intestino.
- Cuando tienes una hemorragia o sangrado grave.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar naproxeno - esomeprazol

- Cuando tienes inflamación en los intestinos.
- Cuando tienes problemas de hígado.
- Cuando tienes problemas de riñón.
- Cuando tienes una reacción en la piel
- Cuando tomas medicamentos para reducir la acidez del estómago.
- Cuando te van a hacer un análisis de sangre para ver la cormogranina A.
- Cuando has tenido una úlcera o sangrado de estómago antes.
- Cuando tienes problemas al corazón.
- Cuando has tenido un ictus o tienes riesgo de sufrirlo.



- Cuando has adelgazado mucho sin motivo.
- Cuando tienes problemas para tragar.
- Cuando tienes vómitos de comida o sangre.
- Cuando haces caca de color negro.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar naproxeno - esomeprazol

- Cuando tomas cualquier otro medicamento con o sin receta.
- Cuando tomas Atazanavir o nelfinavir para tratar la infección del virus VIH.
- Cuando tomas ácido acetilsalicílico o aspirina.
- Cuando estas tomando medicamentos antiinflamatorios para aliviar el dolor.
- Para tratar infecciones por hongos.
- Para tratar el cáncer.
- Para reducir el colesterol.
- Para tratar infecciones.
- Para tratar la ansiedad o relajar los músculos.
- Para tratar la epilepsia.

La epilepsia es una enfermedad que afecta al cerebro.

- Para tratar la depresión.
- Para tratar la artritis reumatoide.
- Para tratar la psoriasis.

La psoriasis es una enfermedad que afecta a la piel.

- Para tratar la enfermedad de la gota que afecta en la acumulación de líquidos en el cuerpo.
- Para tratar el sistema de defensa del cuerpo.
- Para problemas del corazón.
- Para tratar la diabetes.

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de azúcar en sangre son muy altos.

- Para la tensión arterial.



Salud más fácil

- Para evitar la coagulación de la sangre, es decir, que la sangre esté más líquida.
- Para tratar la enfermedad de la tuberculosis, que afecta a los pulmones.
- La hierba de san Juan.
- Para tratar la circulación de la sangre en las piernas.



¿Cuánto naproxeno - esomeprazol puedo tomar?

Toma 1 comprimido de naproxeno - esomeprazol 2 veces al día durante el tiempo que tu médico te indique.



¿Cómo debo tomar naproxeno - esomeprazol?

Sigue estas instrucciones para tomar naproxeno - esomeprazol:

- Toma el comprimido de naproxeno - esomeprazol completo con agua.
No partas, mastiques o tritures los comprimidos.
- Toma naproxeno - esomeprazol 30 minutos antes de comer.
La comida puede reducir el efecto.

El médico puede llevar un control de tu tratamiento cuando tomes naproxeno - esomeprazol durante mucho tiempo.



Deja de tomar naproxeno - esomeprazol de forma inmediata

Deja de tomar naproxeno - esomeprazol

y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Adelgazas mucho sin motivo.
- Tienes problemas para tragar.
- Vomitas comida o sangre.
- Haces caca de color negro.
- Tienes una erupción o ampollas con sangre en la piel.
- Notas pitidos al respirar.
- Notas hinchados los labios, la lengua, la garganta o alguna otra parte del cuerpo.
- Te desmayas.
- Tienes la piel o el blanco de los ojos de color amarillo.
- Tienes la orina de un color más oscuro.
- Notas cansancio.
- Sientes dolor de pecho, cuello y hombros hasta el brazo izquierdo.
- Te sientes confuso.
- Notas debilidad muscular, es decir, notas que pierdes fuerza.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar naproxeno - esomeprazol?

Tómate el comprimido cuando te acuerdes.

Cuando quede poco tiempo para tu próxima dosis
sáltate la dosis olvidada.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.
Espérate y toma la siguiente dosis.



¿Qué hago si he tomado más naproxeno - esomeprazol del debido?

Cuando tienes una sobredosis,
quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas naproxeno / esomeprazol y cuánto has tomado.

Los síntomas que puedes tener con una sobredosis son:

- Mareo.
- Sensación de sueño.
- Dolor de estómago.
- Indigestión.
- Náuseas.
- Problemas de hígado.
- Problemas de riñón.
- Niveles de ácido en sangre altos.
- Dificultad para respirar.
- Desorientación, es decir, no sabes dónde estás.
- Vómitos.
- Sangrado de estómago o intestinos.
- Presión arterial alta.
- Coma.
- Movimientos del cuerpo que no controlas.



Efectos adversos de naproxeno - esomeprazol

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Naproxeno - esomeprazol puede tener los siguientes efectos adversos frecuentes:

- Dolor de cabeza.
- Cansancio.
- Sed.
- Depresión.
- Sensación de falta de aliento.
- Sudor.
- Picor de la piel.
- Vértigo o sensación de que todo da vueltas.
- Marcas de color rojo o morado en la piel.
- Náuseas.
- Vómitos.
- Sensación de palpitos en el corazón.
- Problemas para dormir.
- Problemas en la audición.
- Mareo.
- Manos, pies y tobillos hinchados.
- Inflamación de la boca.
- Problemas de vista.
- Diarrea.
- Dolor de estómago.
- Acidez.
- Indigestión.
- Estreñimiento.
- Gases y eructos.
- Úlceras de estómago.



Salud más fácil

- Inflamación del estómago.
- Pólipos benignos en el estómago.
Los pólipos son tejidos que crecen de forma anormal.

Naproxeno - esomeprazol puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Cuando sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas naproxeno - esomeprazol, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación o algunas otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD o EXP.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.
El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.
Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

