



Pitavastatina



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a tí. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve la pitavastatina?

La pitavastatina es un medicamento para reducir una sustancia que se llama lípidos, que es la grasa que hay en la sangre.

La pitavastatina controla el colesterol total y el colesterol malo en el cuerpo.

El colesterol aumenta el peligro de los pacientes de tener problemas graves de corazón.

El médico receta este medicamento cuando el estado del paciente no puede controlarse solo con la dieta y el ejercicio. También lo receta para prevenir problemas graves de corazón cuando el paciente ha sido operado del corazón.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes pitavastatina.
- No pueden tomar pitavastatina los niños menores de 6 años.
- Avisa a tu médico si estás tomando o has tomando en los últimos días un medicamento para tratar la infección de bacterias o virus.
- Avisa a tu médico si te vas a someter a una operación.
- Las mujeres embarazadas o que dan el pecho no deben tomar pitavastatina.
- Tu médico controlará la diabetes o riesgo de desarrollar diabetes mientras estés tomando este medicamento.
- Este medicamento contiene lactosa. Consulta a tu médico si eres alérgico.



¿Puedo tomar pitavastatina?

Nunca tomes pitavastatina

- Cuando tienes alergia a la pitavastatina.
- Cuando tienes problemas de hígado.
- Cuando estás embarazada o dando el pecho.
- Cuando estás tomando medicamentos porque te han trasplantado algún órgano.
- Cuando tienes dolor de músculos a menudo y no sabes por qué.



Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar pitavastatina

- Tienes problemas respiratorios graves.
- Tienes problemas en los riñones.
- Tienes o has tenido una enfermedad en el hígado.
- Tienes una enfermedad en la glándula tiroides.
La tiroides es una glándula que está en el cuello y genera hormonas.
- Tienes alguna enfermedad de debilidad muscular que afecta a los músculos que utilizamos al respirar o en los ojos.
- Bebes grandes cantidades de alcohol.
- Sufres grandes cambios en tu cuerpo o tienes diabetes.
- Tienes problemas graves para respirar.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar pitavastatina

- Contra una infección bacteriana.
- Para suprimir el sistema inmunológico, es decir, para frenar el sistema de defensas del cuerpo.
- Para bajar el nivel de colesterol malo.
- Para problemas en la piel.
- Antibióticos.
- Para reducir coágulos en la sangre.
Un coágulo es una acumulación de sangre que se vuelve sólida y espesa.
- Para tratar la diabetes.



¿Cuánta pitavastatina puedo tomar?

El médico te informa de la cantidad de comprimidos que debes tomar.

La cantidad habitual es de 1 capsula de 1 miligramo al día, Pero tu médico puede aumentar la cantidad si lo necesitas.

La cantidad máxima es de 4 miligramos al día y en personas con problemas de hígado 2 miligramos al día.

En niños mayores de 6 años el médico indicará la cantidad que debe tomar. Los menores de 6 años no deben tomarlo.



¿Cómo debo tomar pitavastatina?

Pitavastatina está en forma de cápsulas.

Hay que tragarla entera con un poco de agua, sin masticar ni triturar.

Puedes tomar la cápsula con o sin comida. Puedes tomarla a cualquier hora del día, pero es aconsejable hacerlo siempre a la misma hora para recordarlo.

Cuando el niño no puede tragar la capsula puedes abrirla y echar el contenido en un vaso de agua. No puede tomar el medicamento con zumos ni leche.



¿Cómo debes dejar de tomar pitavastatina?

No dejes de tomar pitavastatina de repente.

No dejes de tomar pitavastatina por tu cuenta.

Tu médico te irá reduciendo la dosis poco a poco.



Deja de tomar pitavastatina de forma inmediata

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas pitavastatina, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Deja de tomarla cuando tienes:

- Reacción alérgica.
Por ejemplo, dificultad para respirar, cara o labios y garganta hinchados, o picor en la piel.
- Dolor y debilidad en los músculos, fiebre y la orina de color marrón.
- Problemas en el riñón.
- Problemas en el hígado.
- Problemas al respirar.
- Problemas en el páncreas.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar pitavastatina?

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más pitavastatina del debido?

Cuando tienes una sobredosis,
quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas pitavastatina y cuánto has tomado.



Efectos adversos de pitavastatina

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento
porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Pitavastatina puede tener los siguientes efectos adversos
muy habituales:

- Dolor en las articulaciones.
- Estreñimiento, diarrea o náuseas.
- Dolor de cabeza.

Pitavastatina también puedes tener otros efectos adversos
de forma poco habitual,
rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo
mientras tomas pitavastatina,
avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año al lado de las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

