



Rasagilina



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve la rasagilina?

Rasagilina es un medicamento que sirve para tratar la enfermedad de Parkinson.

Las personas con la enfermedad de Parkinson tienen niveles bajos de una sustancia que produce el cuerpo que se llama dopamina.

Rasagilina tiene un efecto igual a la dopamina y reduce los síntomas de la enfermedad del Parkinson.

La enfermedad del Parkinson afecta al sistema nervioso y a las partes del cuerpo que controlan los nervios.



Avisos importantes

- Avisa a tu médico cuando tomas rasagilina y empiezas o dejas de fumar.
- Avisa a tu médico cuando tomas rasagilina y tienes problemas de hígado, o comienzas a tener problemas o cambios en la piel.
- Avisa a tu médico cuando tomas rasagilina y comienzas a comportarte de un modo extraño o a tener ansiedad y necesidad por hacer cosas arriesgadas.
- Este medicamento no está recomendado a personas menores de 18 años.
- Consulta a tu médico si estás embarazada o crees que puedes estar embarazada.
- Rasagilina puede provocar sueño o alucinaciones. Las alucinaciones son un síntoma en el que oyes o ves cosas que no existen. Debes tener cuidado si vas a conducir o usar máquinas. No debes tomarlo cuando estás tomando medicamentos para la depresión.



¿Puedo tomar rasagilina?

Nunca tomes rasagilina

- Cuando tienes alergia al rasagilina o a alguno de sus componentes.
- Cuando tienes problemas graves de hígado.
- Cuando estás tomando medicamentos para la depresión. Debes esperar 14 días desde que dejas de tomar este medicamento.
- Cuando estás tomando medicamentos fuertes para el dolor.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar rasagilina

- Cuando estás embarazada, crees que puedes estarlo o cuando estás dando del pecho.
- Cuando tienes menos de 18 años.
- Cuando tienes problemas graves de hígado.
- Cuando tienes comportamientos extraños o impulsivos. Por ejemplo, necesidad de apostar dinero en el juego, comer demasiado o deseos sexuales en aumento.
- Cuando tienes alucinaciones.
- Cuando tienes cambios y problemas en la piel.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar rasagilina

- Para tratar la depresión
- Para reducir convulsiones.
- Para tratar problemas en los ojos y la congestión de la nariz.
- Antibióticos que se llaman cirpofloxacino o enoxacino y sirven para tratar infecciones.
- Otros medicamentos para la enfermedad del Parkinson.



¿Cuánta rasagilina puedo tomar?

Lo habitual es tomar 1 comprimido de 1 miligramo una vez al día.

El médico ajustará la dosis adecuada para ti.



¿Cómo debo tomar rasagilina?

Toma el comprimido de rasagilina con un vaso de agua.

Puedes tomarlo junto con alimentos o solo.

¿Cómo debo dejar de tomar rasagilina?

No dejes de tomar rasagilina de repente porque la enfermedad de Parkinson puede empeorar de forma rápida.

Consulta a tu médico antes de dejar de tomar el medicamento.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar rasagilina?

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más rasagilina del debido?

Cuando tienes una sobredosis,
quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas rasagilina y cuánto has tomado.



Efectos adversos del rasagilina

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento
porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Rasagilina puede tener

los siguientes efectos adversos muy habituales:

- Dolor de cabeza.
- Movimientos de tu cuerpo que no haces de forma voluntaria.
- Sentir sueño.
- Náuseas.
- Desmayos.

Rasagilina puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Dolor en el abdomen.
- Caídas.
- Alergia.
- Fiebre.
- Gripe.
- Malestar general.
- Dolor de cuello.



Salud más fácil

- Dolor de pecho.
- Tensión baja.
- Pérdida de apetito.
- Estreñimiento.
- Boca seca.
- Náuseas y vómitos.
- Gases.
- Alteraciones en los análisis la sangre.
- Dolor o inflamación en las articulaciones.
- Dolor o debilidad muscular.
- Pérdida de peso.
- Alteraciones del sueño.
- Dificultad de coordinar movimientos y mantener el equilibrio.
- Depresión.
- Mareos
- Contracciones musculares o espasmos.
- Goteo en la nariz.
- Irritación o sarpullidos de la piel.
- Enrojecimiento de los ojos.
- Necesidad de hacer pis más a menudo.

Rasagilina puede tener también otros efectos adversos poco habituales, raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas rasagilina avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños. Conserva este medicamento en un sitio fresco y dentro de su caja para protegerlo de la luz y la humedad.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.



Salud más fácil

Nunca lo tomes después de esa fecha.

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.
El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.
Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

