



Repaglinida



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el repaglinida?

Repaglinida es un medicamento del grupo llamado antidiabéticos orales, es decir, que introducimos a través de la boca.

Repaglinida sirve para tratar diabetes tipo 2.

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en sangre son demasiado altos.

La diabetes tipo 2 es aquella que no podemos controlar con dieta, ejercicio y u otros medicamentos como la insulina.

La insulina es una sustancia que ayuda a que la glucosa entre en las células para dar energía al cuerpo.



Tomamos repaglinida
junto con otro medicamento llamado metformina,
para ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre
cuando la metformina no consigue bajarlos sola.
Ayuda a producir insulina al cuerpo y a utilizarla de forma adecuada.



Avisos importantes

- Repaglidina es para personas mayores de 18 años de edad.
- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes repaglidina.
- Consulta a tu médico si estás embarazada o crees que puedes estar embarazada.
- Avisa a tu médico si tomas otros medicamentos para la diabetes.
Puede producir hipoglucemia que es la bajada rápida de los niveles de azúcar en tu sangre.
- Puede hacerte desarrollar acidosis láctica.
Es cuando tu cuerpo acumula mucho ácido láctico.
Los síntomas son vómitos, dolor de estómago, calambres en brazos, malestar, dificultad para respirar o frecuencia de latidos de corazón más bajos.
Avisa a tu médico de forma urgente si tienes estos síntomas.
- Deja de tomar repaglidina cuando estés muy deshidratado o desnutrido.
Una persona deshidratada es aquella que necesita beber agua porque lleva mucho tiempo sin beber o por haber estado mucho tiempo al sol.
- Repaglidina no es un sustituto de la insulina.
No la tomes para el tratamiento de la diabetes tipo 1.
La diabetes tipo 1 es una enfermedad que controlamos con insulina.



Salud más fácil

- Tu médico debe realizar revisiones cada año y revisar tus niveles de azúcar cada cierto tiempo.
- Sigue cualquier recomendación de tu médico sobre tu dieta mientras tomas repaglidina.
- El nivel de azúcar en sangre bajo o alto puede afectar a tu capacidad para conducir y utilizar máquinas. Ten en cuenta que puedes ponerte en peligro o poner en peligro a otras personas. Consulta con tu médico la posibilidad de conducir un coche, si tienes niveles altos o bajos de azúcar en sangre.



¿Puedo tomar repaglidina?

Nunca tomes repaglidina

- Cuando tienes alergia a repaglidina o a alguno de sus componentes.
- Cuando tienes diabetes descontrolada o diabetes tipo 1.
- Cuando tienes cetoacidosis.
Es cuando tu cuerpo produce unos ácidos llamados cetonas que son tóxicos.
- Cuando tienes problemas de riñones y de hígado.
- Cuando estás muy deshidratado.
Una persona deshidratada es aquella que necesita beber agua porque lleva mucho tiempo sin beber o por haber estado mucho tiempo al sol.
- Cuando bebes alcohol.
- Cuando estás embarazada, crees que puedes estarlo o estás dando el pecho.



Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar repaglidina.

- Alergia a repaglidina.
- Infecciones.
- Mucho estrés.
- Tomas otros tratamientos para la diabetes.
- Problemas de corazón o de circulación de la sangre.
- Problemas de riñón
- Problemas de hígado.
- Enfermedad de páncreas.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar repaglidina

- Otros medicamentos para la diabetes.
- Para regular los niveles de triglicéridos que es un tipo de grasa que sirve como principal reserva de energía para el cuerpo.
- Antibióticos y medicamentos para tratar infecciones por bacterias.
- Para tratar infecciones por hongos.
- Para eliminar el exceso de hierro en la sangre.
- Para evitar que las plaquetas de la sangre se agrupen.
- Para el sistema nervioso.
- Para los ardores de estómago.
- Para la tensión alta.
- Para los nervios.
- Para controlar el calcio en sangre.
- Para enfermedades de corazón.
- Anticonceptivos para no quedar embarazada.
- Diuréticos.
Es decir, son sustancias que ayudan a eliminar el exceso de líquido a través de la orina.
- Para tratar los niveles de las hormonas tiroideas.



- Un tipo de analgésico que son medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para aliviar el dolor.



¿Cuánta repaglidina puedo tomar?

La dosis de repaglidina recomendada depende de cada persona y de si tomas metformina. Tu médico te indicará cual es la dosis que es mejor para ti y la irá ajustando.

Durante las primeras semanas tu médico te indicará una cantidad más pequeña y durante las siguientes semanas de tratamiento aumentará la cantidad.

La dosis inicial recomendada es de 0,5 miligramos al día.

Tu médico puede ajustar la dosis hasta 4 miligramos. La dosis máxima recomendada es de 16 miligramos al día.



¿Cómo debo tomar repaglidina?

Toma repaglidina de la siguiente forma:

- Traga las pastillas con un vaso de agua.
- Tómalas unos 30 minutos antes de las comidas principales.



¿Cómo debes dejar de tomar repaglidina?

No dejes de tomar repaglidina

a no ser que tu médico te lo diga.

No dejes de tomar repaglidina por tu cuenta.



Deja de tomar repaglidina de forma inmediata

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo

mientras tomas repaglidina

avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Deja de tomar repaglidina

si sientes alguno de estos síntomas:

- Síntomas de acidosis láctica como vómitos, dolor de estómago, calambres en brazos y piernas, malestar y cansancio, dificultad para respirar, bajada de temperatura de tu cuerpo y frecuencia de latidos del corazón más bajos.



¿Qué hago si me he olvidado tomar repaglidina?

Toma la dosis de repaglidina en la siguiente comida

si no es en la toma de la dosis habitual.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más repaglidina del debido?

Cuando tienes una sobredosis,
quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas repaglidina y cuánto has tomado.

Cuando tienes una sobredosis,
tu nivel de azúcar en sangre puede ser muy bajo
y producirte una hipoglucemia.

Una hipoglucemia es una problema del cuerpo que puede ser grave.



Efectos adversos de repaglidina

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento
porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Repaglidina puede tener

los siguientes efectos adversos frecuentes:

- Hipoglucemia
- Cambios del metabolismo y de nutrición.

El metabolismo es el proceso que ocurre en el cuerpo
para transformar los alimentos en energía.

- Problemas del estómago:
 - dolor,
 - diarrea,
 - vómitos
 - náuseas.



Salud más fácil

- Síndrome coronario agudo, es decir, una urgencia médica en la que el ritmo de tu sangre se detiene o reduce.
- Problemas en el hígado.
- Problemas en la piel.

Repaglindina puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas repaglindina, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento, avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

