



Rivaroxabán



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a tí. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve rivaroxabán?

Rivaroxabán es un medicamento que sirve para tratar y para prevenir la aparición de coágulos de sangre. Un coágulo es una masa de sangre que puede bloquear la circulación.

Rivaroxabán hace que la sangre no forme coágulos en las venas o en los vasos sanguíneos del cerebro, de los pulmones o de las piernas. Los vasos sanguíneos son los conductos por los que circula la sangre.



Salud más fácil

Para adultos sirve para prevenir:

- los ictus en el cerebro, que es cuando un coágulo impide que la sangre con oxígeno llegue a alguna zona del cerebro.
- las embolias en los pulmones, que es cuando un coágulo impide que la sangre con oxígeno llegue a los pulmones.
- las trombosis en las piernas, que es cuando un coagulo impide que la sangre vuelva al corazón.



Avisos importantes

- Este medicamento no está recomendado a personas menores de 18 años cuando pesan menos de 30 kilos.
- Este medicamento no está recomendado a mujeres embarazadas. Avisa a un médico si eres mujer embarazada para que te indique qué hacer.
- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes este medicamento.
- Rivaroxobán tiene lactosa y colorantes que pueden provocar alergias. Lleva muy poca cantidad de sodio.
- No debes conducir ni manejar maquinaria cuando lo tomes, puede provocar mareos.
- Sigue tomando este medicamento hasta que el médico te diga lo contrario.



¿Puedo tomar rivaroxabán?

Nunca tomes rivaroxabán

- Cuando tienes alergia al rivaroxabán o a alguno de sus componentes.
- Cuando sangras mucho.
- Cuando tienes alguna enfermedad que provoca hemorragias graves, por ejemplo, úlceras o te han operado hace poco.
Una úlcera es una herida abierta en la piel o en los tejidos internos.
- Cuando tomas medicamentos para evitar coágulos.
- Cuando estás embarazada.
- Cuando tienes problemas graves de hígado.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar rivaroxabán

Consulta a tu médico cuando tienes riesgo de sangrar más por alguno de estos problemas:

- Problemas en los riñones.
- Enfermedades que provoquen hemorragias.
- Tensión arterial alta.
- Enfermedades del estómago o el intestino.
- Problemas en los vasos sanguíneos de los ojos.
- Problemas del corazón o te han colocado una válvula que los médicos colocan en el corazón para asegurar que la sangre circula de forma correcta.
- Enfermedad del sistema inmunitario que forma coágulos.
- Presión arterial poco estable.



Debes informar al médico para que te mande tomar las cantidades necesarias de rivaroxabán cuando vas a ser operado o te van a colocar un catéter para la operación.

Un catéter es un tubo fino para introducir la anestesia.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar rivaroxabán

- Para tratar hongos.
- Para tratar el síndrome Cushing que es una enfermedad hormonal.
- Para tratar infecciones por bacterias.
- Para tratar algún virus.
- Para disminuir la coagulación de la sangre.
- Para aliviar el dolor.
- Para tratar problemas del corazón.
- Para tratar la depresión.
- Para tratar la epilepsia.
- Tranquilizantes.
- Para tratar niveles altos de azúcar en la sangre.
- Medicamentos con plantas medicinales.
- Otros medicamentos para tratar el cáncer de próstata como el ketoconazol.



¿Cuánto rivaroxabán puedo tomar?

Lo habitual es tomar 1 pastilla una vez al día.

La dosis recomendada es de 5, 10, 15 o 20 miligramos al día, según recomendación del médico.

Cuando tienes problemas en los riñones puede ser de 15 miligramos o menos.

Cuando tienes coágulos en la sangre el médico puede indicarte otra cantidad.

El médico te indicará las instrucciones para tomar este medicamento.



¿Cómo debo tomar rivaroxabán?

Toma la pastilla de rivaroxabán con un vaso de agua.

Debes tomar rivaroxabán acompañado de alimentos y a la misma hora todos los días para recordarlo o cuando el médico te indique.

Para niños o adolescentes es importante acudir al médico para pesarles, y que puedan ir ajustando su dosis.

Cuando escupas o vomites la pastilla:

- Si ha pasado más de media hora no debes tomar otra.
- Si ha pasado menos de media hora toma otra pastilla.



Deja de tomar rivaroxabán de forma inmediata

Deja de tomar rivaroxabán

y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Sangrado en el cerebro o cráneo.
En este caso acude de forma inmediata a urgencias.
Los síntomas son:
 - dolor de cabeza,
 - vómitos,
 - convulsiones,
 - pérdida de conciencia o desmayos,
 - cuello con rigidez.
 - y debilidad muscular.
- Reacción o alteraciones en la piel,
por ejemplo, erupciones, ampollas,
o lesiones en la boca y los ojos.
- Fiebre, inflamación en los órganos internos
y cambios en los análisis de sangre.
- Alergia con ojos, labios o boca hinchados,
- Dificultad para respirar y picores.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar rivaroxabán?

Toma el medicamento cuando lo hayas recordado.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.

Toma la siguiente pastilla al día siguiente a la hora habitual y continua el tratamiento de forma normal.



¿Qué hago si he tomado más rivaroxabán del debido?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas rivaroxabán y cuánto has tomado.



Efectos adversos de rivaroxabán

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Rivaroxabán puede tener

los siguientes efectos adversos muy habituales:

- Bajada de los glóbulos rojos con piel pálida, debilidad en músculos y dificultad para respirar.
- Sangrado en órganos o en otras zonas, por ejemplo, ojos o piel.
- Moratones en la piel.
- Sangre al toser.
- Brazos y piernas hinchados o con dolor.
- Fiebre.
- Dolor de estómago y mareos o vómitos.
- Aumento de algunas enzimas o proteínas de la sangre.
- Tensión arterial baja.
- Problemas de riñón.

En niños y adolescentes además de estos pueden presentar:

- Dolor de cabeza.
- Fiebre.
- Sangrado en nariz.
- Vómitos.
- Aumento de los latidos del corazón.
- Subida de la bilirrubina que es una enzima de la sangre.
- Bajada de plaquetas en sangre.
- Menstruaciones con mucho sangrado.



Salud más fácil

Rivaroxabán puede tener

los siguientes efectos adversos poco habituales:

- Sangrado en el cerebro o cráneo.
- Sangrado en los brazos y piernas.
- Bajas plaquetas en sangre.
- Problemas de hígado.
- Desmayos.
- Sensación de malestar.
- Aumento del ritmo del corazón.
- Boca seca.
- Ronchas en la piel.

Rivaroxabán puede tener también otros efectos adversos raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo
mientras tomas rivaroxabán
avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento,
avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Conserva este medicamento en un sitio fresco

y dentro de su caja para protegerlo de la luz y la humedad.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.



Salud más fácil

Nunca lo tomes después de esa fecha.

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.
El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.
Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

